
Инструкция по применению
Джосет Сироп 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Индия
Производитель: Юник
Порядок отпуска: по рецепту
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36



Состав

Сальбутамола сульфат 1.205 мг, что соответствует содержанию сальбутамола 1 мг, бромгексина гидрохлорид 2 мг, гвайфенезин 50 мг, ментол (левоментол) 500 мкг. Вспомогательные вещества: натрия метилпарагидроксибензоат, натрия пропилпарагидроксибензоат, сахароза, пропиленгликоль, натрия сахаринат, сорбиновая кислота, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, сорбитол (некристаллизующийся) жидкий, краситель закатно-желтый, вода очищенная.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Сведения о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся затруднением отхождения мокроты: — бронхиальная астма;— хронический бронхит;— эмфизема легких;— ХОБЛ;— трахеобронхит;— пневмония;— пневмокониоз;— туберкулез легких.

Способ применения и дозы

Препарат следует принимать внутрь. Детям в возрасте до 6 лет - по 1 ч. л. (5 мл) 3 раза /сут; с 6 до 12 лет - по 1-2 ч. л. (5-10 мл) 3 раза/сут. Взрослым и детям старше 12 лет - по 2 ч.л. (10 мл) 3 раза/сут.

Противопоказания

— тахиаритмия;— миокардит;— аортальный стеноз;— декомпенсированный сахарный диабет;— тиреотоксикоз;— глаукома;— печеночная и/или почечная недостаточность;— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;— желудочное кровотечение;— беременность;— период лактации (грудного вскармливания);— повышенная чувствительность к компонентам препарата.;С осторожностью следует применять препарат при сахарном диабете, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе одновременно с противокашлевыми средствами, неселективными блокаторами β-адренорецепторов, ингибиторами МАО.

Условия хранения

В сухом месте