Инструкция по применению
Эбрантил Ампулы 5 мг/мл 10 мл 5 шт

Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Германия
Производитель: Такеда Фармасьютикалс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Урапидил
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 5 мг/мл



Описание

Раствор для в/в введения прозрачный, бесцветный.

Действующее вещество

Урапидил

Форма выпуска

Ампулы

Показания

артериальная гипертензия тяжелой степени (в составе комбинированной терапии).

Способ применения и дозы

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Противопоказания

возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), беременность, период лактации (грудного вскармливания), непереносимость фруктозы и синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы или дефицит сахаразы/изомальтазы, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Определение частоты побочных реакций: очень часто (>1/10), часто (>1/100 и 1/1000 и 1/10 000 и Часто Нечасто Очень редко Частота неизвестна Со стороны сердечно-сосудистой системы Ощущение сердцебиения, тахикардия, брадикардия, чувство сдавления или боли в груди (симптомы, типичные для приступа стенокардии), ортостатическая гипотензия Со стороны пищеварительной системы Тошнота Рвота, диарея, сухость слизистой оболочки полости рта Лабораторные показатели Обратимое повышение активности печеночных ферментов, тромбоцитопения* Со стороны нервной системы Головокружение, головная боль Повышенная утомляемость, нарушения сна Дисфория Со стороны репродуктивной системы Приапизм Со стороны мочевыделительной системы Учащенное мочеиспускание и учащение случаев недержания мочи Со стороны кожи и подкожных тканей Сухость кожи Аллергические реакции Кожный зуд, экзантема, покраснение кожи Ангионевротический отек, крапивница Со стороны дыхательной системы Заложенность носа Общие реакции Генерализованные отеки * В очень редких случаях наблюдалось тромбоцитопения в период применения препарата Эбрантил®, хотя причинная связь с проводимым лечением препаратом путем проведения, например, иммунологических проб, не установлена. Пациент должен сообщить врачу об усилении любых из указанных выше побочных эффектов или появлении любых других побочных эффектов.

Передозировка

Симптомы: выраженное снижение АД, головокружение, повышенная утомляемость, заторможенность, коллапс. Лечение: в течение первых 4 ч после передозировки возможно промывание желудка и применение активированного угля. При выраженном снижении АД пациенту следует придать горизонтальное положение, ноги приподнять, проводить мероприятия по увеличению ОЦК, симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Антигипертензивное действие урапидила может усиливаться при совместном приеме с альфа-адреноблокаторами, вазодилататорами или другими гипотензивными средствами, а также при состояниях, связанных со снижением объема жидкости в организме (диарее, рвоте) и при приеме этанола (алкоголя). При одновременном приеме циметидина Cmax урапидила в плазме крови может увеличиваться на 15%. Не рекомендовано применение с ингибиторами АПФ, поскольку данных о такой комбинации пока недостаточно.

Особые указания

Возможны случаи развития длительной эрекции и приапизма на фоне терапии альфа1-адреноблокаторами. В случае сохранения эрекции в течение более 4 ч следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Если терапия приапизма не была проведена незамедлительно, это может привести к повреждению тканей полового члена и необратимой утрате потенции.