Инструкция по применению
Пассамбра Эдас-306 Сироп гомеопатический 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Эдас
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Описание

Прозрачная густоватая жидкость от светло-желтого до желтого цвета с характерным запахом валерианы.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Passiflora incarnata (пассифлора) С1 - 2,0 г, Ambra grisea (амбра гризеа) С6 – 2,0 г, Pulsatilla pratensis (пульсатилла) С9 – 2,0 г, Tinctura Valerianae (настойка валерианы) – 4,0 г. Вспомогательные вещества: Сахар рафинад 64,80 г, вода очищенная – 25,20 г.

Форма выпуска

Сироп

Показания

В комплексном лечении повышенной раздражительности, возбудимости, нарушения сна, неврозов.

Способ применения и дозы

Внутрь. Перед применением взбалтывать. Если не назначено иначе, взрослым и детям старше 15 лет принимать внутрь вне приема пищи по одной десертной ложке 3 раза в день. Детям по рекомендации врача от 1 года до 3 лет - по 1⁄2 чайной ложки, от 3до 15 лет - по 1 чайной ложке. Длительность курса лечения препаратом 2-4 недели.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. Возможны аллергические реакции. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

  Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Привыкания к препарату или «синдрома отмены» не отмечено. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. В максимальной разовой дозе препарата (10 мл) содержится 0,62 г абсолютного спирта этилового. В максимальной суточной дозе препарата (30 мл) содержится 1,87 г абсолютного спирта этилового. В разовой дозе препарата (10 мл) содержится около 8,4 г сахарозы, что соответствует 0,7 ХЕ. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении