Инструкция по применению
Анабар Эдас-308 Сироп гомеопатический 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Эдас
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0

Описание

Прозрачная густоватая жидкость от светло-желтого до желтого цвета.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

В 100 г сиропа гомеопатического содержатся: Активные компоненты: Semecarpus anacardium (Anacardium) (Семекарпуе анакардиум (Анакардиум)) С6 1,0 г Barium carbonicum (Бариум карбоникум) С6 1,0 г Ferrum phosphoricum (Феррум фосфорикум) С6 1,0 г Arnica montana (Arnica) (Арника монтана (Арника)) С3 1,0 г Echinacea purpurea (Эхинацеа пурпуреа) С3 1,0 г Вспомогательные вещества: Сахароза (сахар белый) 64,80 г Вода очищенная 30,20 г.

Форма выпуска

Сироп

Показания

В комплексной терапии обострений хронических воспалительных заболеваний органов дыхания.

Способ применения и дозы

Детям по рекомендации врача: от 1 года до 3 лет - по 1/2 чайной ложки, от 3 до 12 лет - по 1 чайной ложке, старше 12 лет - по 1 десертной ложке 3 раза в день.Курс лечения препаратом от 2 до 6 недель.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Повышенная чувствительность к растениям семейства астровых (сложноцветных), беременность, период грудного вскармливания (в связи с отсутствием специальных исследований), детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием специальных исследований, противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. Возможны аллергические реакции. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Привыкания к препарату или "синдрома отмены" не отмечено. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. В максимальной разовой дозе препарата (10 мл) содержится 0,62 г абсолютного спирта этилового. В максимальной суточной дозе препарата (30 мл) содержится 1,87 г абсолютного спирта этилового. В разовой дозе препарата (10 мл) содержится около 8,4 г сахарозы, что соответствует 0,7 ХЕ.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении