Инструкция по применению
Экдистен Таблетки 5 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: по рецепту
Количество в упаковке: 1



Описание

Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы, с фаской, от белого до белого с желтоватым оттенком цвета.

Состав

На одну таблетку: Активного вещества: Экдистена в пересчете на 100% вещество 0,005 г Вспомогательных веществ: Сахара (сахароза) 0,089 г Крахмала картофельного 0,005 г Кальция стеарата 0,001 г Масса таблетки 0,1 г

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Астенический синдром, связанный с ослаблением белоксинтезирующих процессов, при длительных интоксикациях, инфекциях, умственное и физическое переутомление, у спортсменов, в качестве лекарственного средства, повышающего скоростно-силовые качества в период подготовки к соревнованиям.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 0,005-0,01 г (по 1-2 таблетки) 3 раза в день после еды, курс лечения - 15-20 дней, по рекомендации врача возможно проведение повторного курса лечения через 1-2 недели, в спортивной медицине применяют по 0,01 г (по 2 таблетки) 3 раза в день в течение 2-3 недель, максимальная разовая доза - 0,01 г (2 таблетки), высшая суточная доза - 0,03 г (6 таблеток).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, нервное возбуждение, бессонница, артериальная гипертензия, эпилепсия, гиперкинез, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет. Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, бессонница, повышение артериального давления, боли в эпигастральной области. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных реакций. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении возможно усиление действия стимуляторов и аналептиков (кофеина, камфоры, фенамина), лекарственный препарат является антагонистом лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе нейролептиков, барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных препаратов).

Особые указания

Для достижения выраженного терапевтического эффекта одновременно с применением препарата необходимо получать с пищей адекватные количества белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. В случае возникновения побочных эффектов, в том числе во избежание нарушения сна, целесообразно уменьшение дозы или прекращение вечернего приема препарата. Пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что в одной таблетке препарата содержится около 0,094 г углеводов (0,008 ХЕ).Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.