Инструкция по применению
Эхинацея Таблетки 30 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эхинацеи пурпурной травы экстракт
Количество в упаковке: 30

Описание

Таблетки круглые двояковыпуклой формы с риской от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями.

Действующее вещество

Эхинацеи пурпурной травы экстракт

Состав

Активного компонента: Эхинацеи . экстракта, сухого с содержанием суммы производных оксикоричных кислот в, пересчете на цикориевую кислоту 7 % - 0,2 г Вспомогательных веществ: Сахара, молочного >-0,190г, , (лактозы моногидрат) Крахмала картофельного - 0,100 г Поливинилпирролидона - 0,005 г низкомолекулярного медицинского (повидон) Кальция стеарата - 0,005 г Масса таблетки - 0,5 г

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные отсутствуют

Показания

Лечение и- профилактика заболеваний сопровождающихся иммунодефицитными состояниями в том числе хронические рецидивирующие -заболевания воспалительного характера (хронические бронхиты пневмонии заболевания ЛОР-органов) при неэффективности или недостаточной эффективности антибактериальной и противовоспалительной терапии.

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым по 1-2 таблетки 3 раза в день после еды. В фазе обострения . заболевания препарат назначают в комплексе с антибактериальной терапией по 2 таблетки 3 раза в день в течение 5 дней затем по 1 таблетке 3 раза в день в течение от 10 до 20 дней в зависимости от характера и тяжести заболевания. В фазе ремиссии назначают по 1-2 таблетки 3 раза в день в течение 10-20 дней. При необходимости курс лечения может быть повторен через 2-3 недели.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата прогрессирующие системные заболевания (туберкулез лейкоз коллагеноз ревматизм рассеянный склероз СПИД, ВИЧ-инфекция аутоиммунные заболевания распространенный атеросклероз) врожденная непереносимость галактозы дефицит лактазы Лаппа глюкозо-галактозная мальабсорбция. Препарат не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 18 лет в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно- только после консультации с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции (гиперемия кожи кожная сыпь отек лица) одышка потливость снижение артериального давления. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметши любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно применение одновременно с антибиотиками и другими противомикробными лекарственными средствами. Несовместим с иммунодепрессантами.

Особые указания

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать что в одной таблетке препарата содержится около 029 г углеводов (0024 ХЕ). Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом работа с движущимися механизмами работа диспетчера и оператора и т.п.).

Срок хранения после открытия

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.