Инструкция по применению
Эхинацея таблетки 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Внешторгфарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эхинацея
Количество в упаковке: 20



Описание

Эхинацея повышает устойчивость организма к вирусным, бактериальным и грибковым инфекциям. У некоторых веществ, содержащихся в экстракте эхинацеи, обнаружена противовирусная активность в отношении вирусов гриппа и герпеса, а также ингибирующее действие на тканевую и бактериальную гиалуронидазу.

Действующее вещество

Эхинацея

Состав

Экстракт сухой травы эхинацеи, жидкая декстроза, сахароза, ароматизатор, очищенная вода.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика ОРВИ и ОРЗ, при начальных признаках гриппа и простуды (в комплексной терапии), в качестве вспомогательного средства при рецидивирующих инфекциях дыхательных путей.

Способ применения и дозы

1 таблетки 3-4 раза в день. Таблетки необходимо держать во рту до полного рассасывания. Для достижения хорошего результата препарат следует принимать не менее 1 недели. Препарат не следует принимать длительное время (более 8 недель).

Противопоказания

Гиперчувствительность к эхинацее пурпурной, к другим растениям семейства сложноцветных (ромашка, арника, золотая маргаритка, бархатцы и др.), а также к любым другим ингредиентам препарата, системные заболевания соединительной ткани, прогрессирующие системные заболевания, такие, как туберкулез, лейкозы, распространенный атеросклероз, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания, СПИД, ВИЧ-инфекция, детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Не следует назначать в течение беременности и периода лактации, поскольку безопасность препарата в этих ситуациях не изучена.

Побочные действия

Аллергические реакции (кожные высыпания, зуд, отек лица, затруднение дыхания, головокружение, снижение артериального давления). При развитии гиперчувствительности прием пастилок необходимо прекратить.

Передозировка

До настоящего времени не было сообщений о случаях интоксикации у человека.

Взаимодействие с другими препаратами

До настоящего времени не было сообщений о взаимодействиях препарата с другими лекарственными средствами. Поскольку эхинацея обладает иммуностимулирующим действием, одновременное применение с иммунодепрессантами и глюкокортикостероидами может ослабить их эффект, а одновременное использование препарата с цитокинами может усилить их эффект.

Особые указания

Препарат не следует принимать длительное время (более 8 недель). Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата.