Инструкция по применению
Эхинацея ВИЛАР Сок 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Вилар
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета со специфическим запахом. Допускается наличие осадка.

Состав

Для получения препарата используют: Эхинацеи пурпурной трава свежая - 1710 г, Вспомогательное вещество: Спирт этиловый (этанол) 95 % - 270 г.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Препарат применяют у взрослых и детей старше 12 лет в качестве иммуностимулирующего средства для усиления неспецифической иммунной реакции при часто повторяющихся острых воспалительных процессах или обострениях хронических заболеваний респираторных и мочевыводящих путей, а также при других заболеваниях, сопровождающихся снижением иммунного статуса организма.

Способ применения и дозы

Эхинацея ВИЛАР сок назначают взрослым и детям старше 12 лет внутрь после еды с небольшим количеством воды. В острый период заболевания (первые 3-5 дней) - по 30-40 капель на прием 3-4 раза в день, в дальнейшем - по 20-30 капель на прием до 3-4 раз в день в течение 2-х недель. Максимальная разовая доза - 60 капель (3 мл), максимальная суточная доза - 240 капель (12 мл). Длительность лечения определяется состоянием больного и при необходимости может быть продлена до 1-1,5 месяцев по согласованию с лечащим врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, прогредиентные системные заболевания (туберкулез, лейкоз, коллагеноз, рассеянный склероз, СПИД, ВИЧ-инфекция), бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период грудного вскармливания препарат следует применять только по согласованию с лечащим врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, иногда озноб, гиперемия.

Передозировка

Острое отравление и передозировка маловероятны. До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно одновременное применение с антибиотиками и другими антимикробными средствами. Не следует принимать препарат в течение 3-х суток после окончания курса лечения производными цефалоспорина (цефамандол, цефотетан, цефменоксим, цефоперазон, моксалатам). Препарат несовместим с иммуносупрессорами.

Особые указания

В максимальной суточной дозе препарата (240 капель) содержится 1,8 г абсолютного спирта, в максимальной разовой дозе (60 капель) содержится 0,45 г абсолютного спирта.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.