
Инструкция по применению
Экодакс® Крем 1% 10 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Индия
Производитель: Johnson & Johnson
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Эконазол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Эконазол

Состав

Эконазола нитрат 10 мгВспомогательные вещества: натрия гидроксид - 0.9 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат - 3.65 мг, фосфорная кислота - 0.02 мг, хлорокрезол - 1 мг, цетомакрогол 1000 - 50 мг, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт 60%, стеариловый спирт 40%) - 70 мг, парафин белый мягкий - 150 мг, парафин жидкий - 60 мг, вода очищенная - ск. треб. до 1 г.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При наружном применении препарат проникает во все слои кожи и ногтевую пластину. Терапевтические концентрации создаются в роговом и других слоях эпидермиса, а также в дерме. При нанесении на кожу системная абсорбция минимальна и практически незначима. Менее 1 % применяемой дозы выводится с каловыми массами - кишечником, и почками.

Показания

— дерматомикозы кожи волосистой части головы, вызванные дерматофитами, дрожжами, плесневыми грибами, в т.ч. осложненные суперинфекцией грамположительными бактериями;— эритразма;— разноцветный лишай;— кожные инфекции, вызванные грамположительными микроорганизмами.

Способ применения и дозы

Наружно.Взрослые и дети старше 18 лет: на пораженный участок кожи наносят крем тонким ровным слоем и втирают до полного впитывания 2 раза в день (утром и вечером).Длительность применения - 2 недели, при лечении высококератинизированных участков кожи (стоп) - до 1,5 месяцев.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к эконазолу и другим компонентам, входящим в состав препарата;— детский возраст до 18 лет.Не наносить препарат на участки с повреждением кожных покровов.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности (I-II триместр) применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.При назначении препарата в период лактации необходимо прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Индивидуальная непереносимость эконазола и других компонентов, входящих в состав препарата.Возможны местные реакции в виде жжения, зуда, раздражения и гиперемии кожи, крапивницы, сухости, гипопигментации, атрофии кожи.

Передозировка

При случайном приеме крема внутрь возможны тошнота, рвота, диарея.Лечение: промывание желудка, прием внутрь активированного угля, проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Данные отсутствуют.

Особые указания

У больных экземой перед началом лечения необходимо провести противоэкземную терапию. При отсутствии эффекта от проводимой терапии в рекомендованные сроки необходимо верифицировать диагноз. При появлении первых симптомовгиперчувствительности препарат необходимо отменить.Избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки, на открытые раны. В случае развития любых из побочных эффектов при применении препарата следует прекратить его дальнейшее использование и обратиться к врачу.Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата для медицинского применения на способность управлять транспортными средствами, механизмамиПрепарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими, потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Не допускать замерзания