Инструкция по применению
Экофемин вагинальные капсулы 12 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Дания
Производитель: Бифодан
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лактобактерии ацидофильные
Количество в упаковке: 12



Описание

Живые лактобактерии, входящие в вагинальные капсулы Экофемин, обладают антагонистической активностью в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных бактерий (включая стафилококки, протей, энтеропатогенную кишечную палочку), нормализуют пищеварительную деятельность ЖКТ, улучшают обменные процессы, способствуют восстановлению естественного иммунитета. Метаболизируют гликоген вагинального эпителия до молочной кислоты, которая поддерживает pH влагалища на уровне 3.8-4.2. Молочная кислота в высокой концентрации создает неблагоприятные условия для жизнедеятельности кислочувствительных патогенных и условно-патогенных бактерий.

Действующее вещество

Лактобактерии ацидофильные

Состав

Лактобактерии ацидофильные, лактозы моногидрат и стеарат магния, желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Препарат предназначен для:-нормализации микрофлоры влагалища,-предупреждения и лечения заболеваний, обусловленных нарушением баланса вагинальной микрофлоры, в том числе в качестве второго этапа терапии бактериального вагиноза, неспецифического вульвовагинита, гормонозависимого кольпита,-профилактики послеоперационных инфекционных осложнений, при подготовке к плановым гинекологическим операциям, диагностическим инвазивным процедурам,-профилактики восходящего инфицирования в родах в период предродовой подготовки,-восстановления микрофлоры влагалища после системной и местной антибиотикотерапии.

Способ применения и дозы

Терапевтическая доза: 1 вагинальная капсула 2 раза в день в течение 6 дней. При необходимости по назначению врача курс лечения повторяют. Профилактическая доза: 1 вагинальная капсула на ночь в течение 3-7 дней. Лечение и профилактику нужно проводить перед ожидаемой менструацией или сразу же после менструации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат можно использовать в период беременности и лактации.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат может быть использован в сочетании с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Противопоказания: вагинальный кандидоз.