Инструкция по применению
Экофурил Капсулы 200 мг 16 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Авва Рус
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нифуроксазид
Количество в упаковке: 16
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 60



Действующее вещество

Нифуроксазид

Состав

1 капсула содержит:Активное вещество: нифуроксазид 200 мг.Вспомогательные вещества: лактулоза - 300 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 58 мг, крахмал картофельный - 18 мг, магния стеарат - 6 мг, сахароза - до получения массы содержимого капсулы 630 мг.Состав твердой желатиновой капсулы: желатин - до 100%, вода - 14-15%; крышечка: краситель пунцовый [Понсо 4R] - 0.079801%, краситель синий патентованный - 0.00165%, краситель солнечный закат - 0.093301%, титана диоксид - 0.813158%; корпус: краситель хинолиновый желтый - 0.583356%, краситель солнечный закат - 0.002565%, титана диоксид - 0.974035%.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После перорального применения нифуроксазид практически не всасывается из пищеварительного тракта и свое антибактериальное действие оказывает исключительно в просвете кишечника. Полностью выводится через ЖКТ. Скорость элиминации зависит как от дозы препарата, так и от моторики кишечного тракта.

Показания

Острая диарея бактериального генеза (при отсутствии подозрений на инвазию).

Способ применения и дозы

Внутрь. Терапия нифуроксазидом не должна продолжаться более 7 дней. Взрослым и детям старше 7 лет препарат назначают по 1 капсуле (200 мг) 4 раза в сутки, суточная доза - 800 мг. Детям 3–7 лет препарат назначают 1 капсуле (200 мг) 3 раза в сутки, суточная доза - 600 мг.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к производным нитрофурана. Не применять у новорожденных (возраст до 1 месяца) и недоношенных детей.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Энтерофурил при беременности возможно только в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода. Энтерофурил не абсорбируется из ЖКТ и не попадает в системное кровообращение, однако применение препарата в период лактации возможно только по строгим показаниям, при этом следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции (сыпь, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок), тошнота, рвота.

Передозировка

Препарат не абсорбируется из ЖКТ и не попадает в системное кровообращение. Симптомы передозировки не известны. В случае превышения дозы рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

При лечении диареи одновременно с терапией нифуроксазидом необходимо проводить регидратационную терапию (пероральную или внутривенную) в соответствии с состоянием пациента и интенсивностью диареи. Запрещено применение алкоголя во время терапии нифуроксазидом. До назначения суспензии грудным детям необходимо исключить у них врожденный дефицит ферментов, расщепляющих сахарозу. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Препарат не влияет на психомоторную деятельность и способность управлять транспортом и работать с механизмами.

Условия хранения

В сухом темном месте