Инструкция по применению
Эколинком капсулы 250мг N20

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Авва Рус
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Линкомицин
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 250 мг
Срок годности: 48.0



Действующее вещество

Линкомицин

Состав

Линкомицин (в форме гидрохлорида моногидрата) 250 мг;Вспомогательные вещества: лактулоза - 300 мг, повидон низкомолекулярный - 10 мг, тальк - 10 мг, магния стеарат - 5 мг, крахмал картофельный - до 650 мг.;Состав оболочки капсулы: желатин, вода, титана диоксид, краситель хинолиновый желтый, краситель солнечный закат желтый.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Абсорбция - 30-40% (прием пищи замедляет скорость и степень всасывания). Время достижения Cmax - 2-3 ч. Хорошо проникает в ткани легких, печени, почек, через плацентарный барьер, в грудное молоко; в высоких концентрациях обнаруживается в костной ткани и суставах. Через гематоэнцефалический барьер линкомицин проникает незначительно, при менингите - проницаемость повышается.;Частично метаболизируется в печени. T1/2 - 5 ч. Выводится в неизмененном виде и в виде метаболитов с желчью и почками.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными микроорганизмами (прежде всего, стафилококками и стрептококками, особенно микроорганизмами, устойчивыми к пенициллинам, а также при аллергии к пенициллинам): — сепсис; — подострый септический эндокардит; — хроническая пневмония; — абсцесс легкого; — эмпиема плевры; — плеврит; — отит; — остеомиелит (острый и хронический); — гнойный артрит; — послеоперационные гнойные осложнения; — раневая инфекция; — инфекции кожи и мягких тканей (пиодермия, фурункулез, флегмона, рожистое воспаление).

Способ применения и дозы

Внутрь, за 1-2 ч до или через 2-3 ч после еды, 2-3 раза в день с интервалом 8-12 часов. Для взрослых суточная доза - 1-1,5 г, разовая - 0,5 г. Для детей в возрасте от 3 до 14 лет суточная доза - 30-60 мг/кг.;Продолжительность лечения в зависимости от формы и тяжести заболевания составляет 7-14 дней (при остеомиелите - 3 недель и более).;При длительных или повторных курсах лечение следует проводить под контролем функции печени и почек.

Противопоказания

— гиперчувствительность; — беременность (за исключением случаев, когда это необходимо по "жизненным" показаниям),;— период лактации; — тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность; — детский возраст до 3 лет.;С осторожностью: грибковые заболевания кожи, слизистой оболочки полости рта, влагалища.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано во время беременности за исключением случаев, когда это необходимо по "жизненным" показаниям.;Противопоказано применение в период лактации.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, боли в эпигастрии, боль в животе, глоссит, стоматит, транзиторная гипербилирубинемия, повышение активности "печеночных" трансаминаз; при длительном применении - кандидоз ЖКТ, псевдомембранозный энтероколит.;Другие грибковые инфекции генитального тракта.; Со стороны органов кроветворения: обратимые лейкопения, тромбоцитопения, нейтропения.;Аллергические реакции: крапивница, эксфолиативный дерматит, ангионевротический отек, анафилактический шок.

Передозировка

Нет данных о передозировке препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Антагонизм - с эритромицином, хлорамфениколом, ампициллином, и другими бактерицидными антибиотиками, синергизм с аминогликозидами.;Противодиарейные лекарственные средства снижают эффект линкомицина (интервал между их применением должен составлять не менее 4 ч).;Усиливает действие лекарственных средств для ингаляционного наркоза, миорелаксантов и опиоидных анальгетиков, повышая риск нервно-мышечной блокады и остановки дыхания.;При одновременном применении с линкомицином, ингибитором Р450, сывороточная концентрация теофиллина может увеличиваться и это потребует снижение его дозы.

Особые указания

На фоне длительного лечения необходим периодический контроль активности "печеночных" трансаминаз и функции почек.;Назначение пациентам с печеночной недостаточностью допустимо лишь по "жизненным" показаниям.;При появлении признаков псевдомембранозного энтероколита (диарея, лейкоцитоз, лихорадка, боль в животе, выделение с каловыми массами крови и слизи) в легких случаях достаточно отмены препарата и назначения ионообменных смол (колестирамин), в тяжелых случаях показано возмещение потери жидкости, электролитов и белка, ванкомицин - внутрь, в суточной дозе 0.5-2 г (за 3-4 приема) в течение 10 дней или бацитрацин.

Условия хранения

В сухом месте