Инструкция по применению
Эксинта Капли глазные 0,007 % 5 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Гротекс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Аминобензойная кислота
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.07 мг/мл



Описание

Прозрачный бесцветный или желтоватый, или коричневатый раствор.

Действующее вещество

Аминобензойная кислота

Состав

Состав препарата на 1 мл:Действующее вещество:Аминобензойная кислота 0,07 мгВспомогательные вещества:Натрия хлорид 9,0 мгНатрия гидроксида раствор 1 М до pH 3,5 - 5,0Вода для инъекций до 1 мл

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При инстилляции в конъюнктивальный мешок аминобензойная кислота быстро всасывается и проявляет терапевтическое действие.

Показания

В качестве монотерапии и в составе комплексной терапии вирусных поражений глаза: конъюнктивиты, кератоконъюнктивита, кератоувеиты, вызываемые вирусом герпеса (herpes simplex, herpes zoster), аденовирусами, кератопатии инфекционного, посттравматического и послеоперационного генеза.

Способ применения и дозы

Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 6-8 раз в день.После клинического выздоровления продолжать инстилляции по 2 капли 3 раза в день в течение 7 дней.Порядок работы с флаконом:1. Вращающими движениями против часовой стрелки открыть флакон и снять колпачок.2. Осторожно, не касаясь пальцами наконечника флакона, перевернуть флакон, зафиксировать между большим и указательным пальцами одной руки.3. Запрокинуть голову назад, расположить наконечник флакона над глазом и указательным пальцем другой руки оттянуть нижнее веко вниз. Слегка надавить на флакон и закапать необходимое количество препарата в конъюнктивальный мешок глаза.Необходимо избегать контактов наконечника открытого флакона с поверхностью глаза и руками.4. После использования надеть колпачок на флакон и закрыть вращающими движениями по часовой стрелке.Порядок работы с флаконом, укомплектованным насадкой-упором для пальцев:1. Потянув за защитный колпачок вверх, открыть флакон.2. Осторожно, не касаясь пальцами наконечника флакона, перевернуть флакон и, расположив большой палец одной руки на специальной насадке-упоре, сделать несколько нажатий до появления первой капли.3. Запрокинуть голову назад, расположить наконечник флакона над глазом и указательным пальцем другой руки оттянуть нижнее веко вниз. 4. Держа большой палец на насадке-упоре, нажать на нее и закапать необходимое количество препарата в конъюнктивальный мешок глаза.Необходимо избегать контактов наконечника открытого флакона с поверхностью глаза и руками.5. После использования надеть колпачок на флакон.После вскрытия флакона препарат можно использовать в течение 14 дней. По истечении этого срока препарат следует выбросить.При видимых повреждениях флакона применять препарат не следует.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к аминобензойной кислоте и вспомогательным веществам.

Применение при беременности и кормлении грудью

До настоящего времени данные клинических испытаний относительно применения препарата во время беременности, лактации, а также у детей отсутствуют. Однако препарат может применяться в том случае, если предполагаемая польза превышает риск.

Побочные действия

В очень редких случаях наблюдаются конъюнктивальная гиперемия, местные аллергические реакции.Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

В комбинации с аналогами нуклеозидов (ацикловир, ганцикловир и др.), противомикробными средствами (фторхинолоны) и антибиотиками (полимиксин В) усиливается терапевтическое действие этих препаратов.Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Не применять препарат одновременно с сульфаниламидными препаратами и их производными (сульфацил натрия).Применять препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмамиНе отмечено.

Срок хранения после открытия

14 дней

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.