Инструкция по применению
Экстрасорб Капсулы 250 мг 20 шт



Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Авексима
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Активированный уголь
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 250 мг

Описание

Капсулы № 0 с корпусом и крышечкой черного цвета. Содержимое капсул - порошок черного цвета.

Действующее вещество

Активированный уголь

Состав

На одну капсулу: действующее вещество: активированный уголь - 220 мг или 250 мг, вспомогательные вещества: капсулы твердые желатиновые [желатин - до 100 %, оксид железа черный Е 172 - 1,3333 %, краситель бриллиантовый черный Е 151 - 0,7135 %]. Масса содержимого капсулы - 220 мг или 250 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Не всасывается не расщепляется выделяется полностью через желудочно-кишечный тракт в течение 24 часов.

Показания

Экзогенные и эндогенные интоксикации различного происхождения (в качестве детоксицирующего средства). Пищевые токсикоинфекции дизентерия сальмонеллез (при комплексном лечении). Отравления лекарственными препаратами (психотропными снотворными наркотическими) алколоидами солями тяжелых металлов и другими ядами. Заболевания желудочно-кишечного тракта. сопровождающиеся диспепсией и метеоризмом. Пищевая и лекарственная аллергия. Гипербилирубинемия (вирусный гепатит и другие желтухи) и гиперазотемия (почечная недостаточность). Для уменьшения газообразования в кишечнике перед ультразвуковым и рентгенологическим исследованиями. С целью профилактики хронических интоксикаций на вредном производстве.

Способ применения и дозы

Внутрь за 1 ч до еды и приема других лекарственных средств запивая водой. Не рекомендуется запивать другими жидкостями во избежание снижения эффективности активированного угля. Средняя доза составляет 100-200 мг/кг/сут (в 3 приема). Длительность лечения - 3-14 дней при необходимости возможен повторный курс через 2 нед. Детям назначается в среднем из расчета 50 мг/кг массы тела 3 раза в сутки максимальная разовая доза до 200 мг/кг массы тела. Детям до 3 лет и другим пациентам с затруднением проглатывания капсулу можно вскрыть высыпать содержимое капсулы в емкость и развести небольшим количеством воды (не следует использовать для разведения другие жидкости) и принимать в виде суспензии. Взрослым назначают в среднем по 10-20 г 3-4 раза в сутки. Максимальная разовая доза для взрослых до 80 г. Курс лечения при острых заболеваниях составляет 3-5 дней при аллергических и других хронических заболеваниях - до 14 дней. Возможно проведение повторных курсов по рекомендации врача. При острых интоксикациях лечения начинают с промывания желудка 10-20% взвесью активированного угля (для чего используют активированный уголь в порошке для приготовления суспензии) затем переходят на прием внутрь - до 20-30 г/сут. При диспепсии метеоризме - по 1 -2 г 3-4 раза в сутки. Курс лечения 3-7 дней. При заболеваниях сопровождающихся процессами брожения и гниения в кишечнике при повышенной секреции желудочного сока взрослым назначают - по 8-10 г 3 раза в сутки в промежутках между приемами пищи детям до 7 лет - по 4-5 г 7-14 лет - по 5-7 г на прием. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются или появляются новые симптомы необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям тому способу применения и в тех дозах которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата язвенные поражения желудочно- кишечного тракта (ЖКТ) (в том числе язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки неспецифический язвенный колит) кровотечения из ЖКТ атония кишечника одновременное назначение антитоксических лекарственных средств эффект которых развивается после всасывания (метионин и другие).

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом

Побочные действия

Диспепсия запор или диарея окрашивание каловых масс в темный цвет. При длительном применении (более 14 дней) возможно снижение всасывания витаминов кальция и других питательных веществ из желудочно-кишечного тракта. Если у Вас отмечаются побочные эффекты указанные в инструкции или они усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственный препарат снижает эффективность одновременно принимаемых лекарственных средств уменьшает эффективность лекарственных средств уменьшает активность лекарственных средств действующих на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта (в т. ч. ипекакуаны и термопсиса).

Особые указания

РПри лечении интоксикаций необходимо создать избыток активированного угля в желудке (до его промывания) и в кишечнике (после промывания желудка). Уменьшение концентрации активированного угля в среде способствует десорбции связанного вещества и его всасыванию (для предупреждения резорбции освободившегося вещества рекомендуется повторное промывание желудка и назначение активированного угля). Наличие пищевых масс в желудочно-кишечном тракте требует введения в высоких дозах так как содержимое желудочно-кишечного тракта сорбируется активированным углем и его активность снижается. Если отравление вызвано веществами участвующими в энтерогепатической циркуляции (сердечные гликозиды индометацин морфин и другие опиаты) необходимо применять активированный уголь в течение нескольких дней. При использовании препарата более 10-14 дней необходимо профилактическое назначение витаминов и препаратов кальция. Рекомендуется хранить в сухом месте отдельно от веществ выделяющих в атмосферу газы или пары. Хранение на воздухе (особенно влажном) снижает сорбционную способность. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами работа с движущимися механизмами работа диспетчера и оператора).

Срок хранения после открытия

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить контурную ячейковую упаковку в пачке из картона. Хранить в недоступном для детей месте.