Инструкция по применению
Экзитер таблетки 250 мг 14 шт 2+1

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тербинафин
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 250 мг

Описание

Противогрибковый препарат

Действующее вещество

Тербинафин

Состав

тербинафин (в форме гидрохлорида) 250 мгВспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмала гликолат, крахмал прежелатинизированный, магния стеарат, кремний коллоидный безводный.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь хорошо абсорбируется из ЖКТ. Связывание с белками плазмы - 99%. Тербинафин диффундирует через дермальный слой кожи и накапливается в липофильном роговом слое, секретируется в кожный жир, в результате этого создаются высокие концентрации в волосяных фолликулах, ногтях. В течение первых нескольких недель после начала приема тербинафин накапливается в коже и ногтевых пластинках в концентрациях, обеспечивающих фунгицидное действие. Метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболитов. Выводится с мочой, главным образом в виде метаболитов. T1/2 - 17 ч.

Показания

Для приема внутрь: грибковые поражения кожи, вызванные дерматофитами, - трихофития, эпидермофития, микроспория, грибковые поражения ногтей (онихомикозы), кандидоз.Для наружного применения: грибковые поражения кожи, вызванные дерматофитами, кандидоз, разноцветный лишай.

Способ применения и дозы

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.Внутрь взрослым - 250 мг/сут в 1 или 2 приема. Продолжительность лечения зависит от показаний и тяжести инфекции: при кожных поражениях - 2-4 нед., при поражении ногтей - от 6 нед. до 4 мес и более. Детям с массой тела более 40 кг - 250 мг/сут, 20-40 кг - 125 мг/сут, до 20 кг - 62.5 мг/сут.Наружно применяют 1-2 раза/сут в течение 1-2 нед.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к тербинафину.

Применение при беременности и кормлении грудью

Опыт применения тербинафина при беременности ограничен. При необходимости назначения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, анорексия, умеренные боли в животе, диарея, нарушения или потеря вкусовых ощущений, холестаз, желтуха, гепатит.Аллергические реакции: кожная сыпь, редко - артралгия, миалгия, многоформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона.Со стороны ЦНС: головная боль. Со стороны системы кроветворения: нейтропения, тромбоцитопения.Местные реакции: гиперемия, зуд, ощущение жжения.

Взаимодействие с другими препаратами

Препараты, вызывающие индукцию микросомальных ферментов печени, увеличивают клиренс тербинафина, препараты, ингибирующие микросомальные ферменты печени - уменьшают клиренс тербинафина.

Особые указания

Следует с осторожностью применять тербинафин для приема внутрь у пациентов с нарушениями функции печени и/или почек, а также у лиц пожилого возраста.