Инструкция по применению
Экзодерил крем 1% 15 г х 2

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Австрия
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 2
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 36



Действующее вещество

Нафтифин

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

Всасывание и распределение При наружном применении нафтифин хорошо проникает в различные слои кожи, достигая достаточных для осуществления противогрибкового действия концентраций. После аппликации на кожу крема системной абсорбции подвергается менее 6% действующего вещества. Метаболизм и выведение Всосавшееся количество частично подвергается метаболизму и выводится почками и через кишечник. T1/2 составляет 2-3 дня.

Показания

грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea corporis, tinea inguinalis), в т.ч. межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum); грибковые инфекции ногтей (онихомикозы); кандидозы кожи; отрубевидный лишай; дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него).

Способ применения и дозы

Экзодерил® следует наносить на пораженную поверхность кожи и соседние с ней участки 1 раз/сут, после тщательной очистки и высушивания, захватывая приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения. Длительность лечения при дерматомикозах - 2-4 недели (при необходимости - до 8 недель), при кандидозах - 4 недели. При онихомикозах перед первым применением крема необходимо максимально удалить пораженную часть ногтя ножницами и пилкой для ногтей. Препарат следует применять 2 раза/сут, длительность лечения - до 6 мес. Для предупреждения рецидивов инфекции следует проводить терапию в течение не менее 2 недель после исчезновения клинических симптомов.

Противопоказания

беременность (безопасность и эффективность не определена); период лактации (безопасность и эффективность не определена); повышенная чувствительность к нафтифину, бензиловому спирту или другим компонентам препарата. С осторожностью: детский возраст (опыт клинического применения ограничен).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата Экзодерил® при беременности и в период лактации (безопасность и эффективность не определена).

Побочные действия

Местные реакции: в отдельных случаях - сухость кожи, гиперемия, жжение. Побочные эффекты обратимы и не требуют отмены терапии.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Особые указания

С осторожностью: детский возраст (опыт клинического применения ограничен). Препарат не предназначен для применения в офтальмологии. Следует избегать попадания препарата в глаза. Не требуется специальных мер по уничтожению препарата. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Препарат не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.