Инструкция по применению
Экзодерил Крем 1 % 15 г

Характеристики



Форма выпуска: Крем
Страна: Австрия
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 60

Описание

Экзодерил® - линейка экспертных средств1 в лечении грибка ногтя и кожи2 Грибок ногтя может спровоцировать грибок кожи, а в 8 из 10 случаев грибок кожи провоцирует грибок ногтей3 . Поэтому препарат Экзодерил® выпускается в двух формах, которые позволяют при необходимости проводить комплексную терапию грибковой инфекции: - форма крема Экзодерил® не содержит этилового спирта, который может раздражать кожу, и удобнее для лечения грибка кожи4 - форма раствора Экзодерил® предпочтительна для лечения грибка ногтя благодаря способности глубокого проникать в ногтевую пластину 4 Крем Экзодерил® — это лекарственное средство для лечения грибка кожи кистей, стоп и туловища. Он оказывает тройное действие: противогрибковое, антибактериальное и противовоспалительное. Крем воздействует непосредственно на грибковую инфекцию, и помогает бороться с неприятными проявлениями грибка кожи - зудом, покраснением5 и бактериями, возможной причиной запаха6 1.Линейка наружных противогрибковых препаратов компании ЗАО «Сандоз»: Экзодерил® крем, Экзодерил® раствор, Экзоролфинлак® лак 2. Экзодерил® (крем или раствор) можно применять для лечения грибка кожи, грибка ногтя. Экзоролфинлак® показан для лечения и профилактики грибковых поражений ногтей 3. Е.И. Горская. Скрытые формы микозов стоп: диагностика и лечение. Экспериментальная и клиническая дерматокосметология. - 2013. - № 1. 4. Лыкова СГ, Спицына АВ, Петренко ОС. Местная антимикотическая терапия: подробные ответы на актуальные вопросы. РМЖ. 201523 (9):486-91. Экзодерил® (крем или раствор) можно применять для лечения грибка кожи, грибка ногтя. 5. Покраснение как признак воспаления при дерматомикозе. 6. Запах - как признак присоединения вторичной бактериальной инфекции при микозе стоп

Действующее вещество

Нафтифин

Состав

1 г крема содержит: активное вещество: нафтифина гидрохлорид – 10,0 мг. вспомогательные вещества: натрия гидроксид - 1,2 мг, бензиловый спирт - 10,0 мг, сорбитана стеарат - 19,0 мг, цетилпальмитат - 20,0 мг, цетиловый спирт - 40,0 мг, стеариловый спирт - 40,0 мг, полисорбат 60 – 61,0 мг, изопропилмиристат – 80,0 мг, вода очищенная – 718,8 мг.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При наружном применении хорошо проникает в различные слои кожи, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных ее слоях. После нанесения на кожу системной абсорбции подвергается менее 6 % нафтифина. Всосавшееся количество частично подвергается метаболизму и выводится почками и через кишечник. Период полувыведения препарата составляет 2 - 3 дня.

Показания

грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea corporis, tinea inguinalis), в т.ч. межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum) - грибковые инфекции ногтей (онихомикозы) - кандидозы кожи - отрубевидный лишай - дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него).

Способ применения и дозы

Наружно. При поражении кожи Экзодерил® наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и соседние с ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Длительность терапии при дерматомикозах – 2-4 недели (при необходимости – до 8 недель), при кандидозах – 4 недели. При поражении ногтей Экзодерил® наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах – до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов.

Противопоказания

Гиперчувствительность к нафтифину, бензиловому спирту или другим компонентам препарата беременность и период лактации (безопасность и эффективность применения не определены).

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи и жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не отмечено взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Особые указания

Меры предосторожности при применении: Препарат Экзодерил® не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза. Влияние на способность управлять транспортными средствами и др. механизмами: Экзодерил® не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Срок хранения после открытия

После вскрытия тубы препарат годен к применению в течение 4 недель.

Условия хранения

Беречь от детей