Инструкция по применению
Экзодерил Раствор для наружного применения 1 % 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Австрия
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 60

Описание

Экзодерил® - линейка экспертных средств1 в лечении грибка ногтя и кожи2 Грибок ногтя может спровоцировать грибок кожи, а в 8 из 10 случаев грибок кожи провоцирует грибок ногтей3 . Поэтому препарат Экзодерил® выпускается в двух формах, которые позволяют при необходимости проводить комплексную терапию грибковой инфекции: - форма крема Экзодерил® не содержит этилового спирта, который может раздражать кожу, и удобнее для лечения грибка кожи4, - форма раствора Экзодерил® предпочтительна для лечения грибка ногтя благодаря способности глубокого проникать в ногтевую пластину 4 Экзодерил® раствор прицельно наносится благодаря уникальной насадке5. 1.Линейка наружных противогрибковых препаратов компании ЗАО «Сандоз»: Экзодерил® крем, Экзодерил® раствор, Экзоролфинлак® лак , 2. Экзодерил® (крем или раствор) можно применять для лечения грибка кожи, грибка ногтя. Экзоролфинлак® показан для лечения и профилактики грибковых поражений ногтей 3. Е.И. Горская. Скрытые формы микозов стоп: диагностика и лечение. Экспериментальная и клиническая дерматокосметология. - 2013. - № 1. 4. Лыкова СГ, Спицына АВ, Петренко ОС. Местная антимикотическая терапия: подробные ответы на актуальные вопросы. РМЖ. 2015,23 (9):486-91. Экзодерил® (крем или раствор) можно применять для лечения грибка кожи, грибка ногтя. 5. Уникальная насадка в России для лекарственных препаратов в форме раствора, содержащих нафтифин, по данным ЗАО “Сандоз” от 08.06.2020

Действующее вещество

Нафтифин

Состав

1 мл раствора содержит: активное вещество: нафтифина гидро- хлорид – 10 мг, вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 50 мг, этанол - 400 мг, вода очищенная - 475 мг.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Нафтифин быстро проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных ее слоях, что делает возможным его применение один раз в день.

Показания

грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea corporis, tinea inguinalis), в т.ч. — межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum), — грибковые инфекции ногтей (онихомикозы), — кандидозы кожи, — отрубевидный лишай, — дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него). Экзодерил® эффективен при лечении микозов, поражающих области кожи с гиперкератозом, а также в зонах роста волос.

Способ применения и дозы

Наружно. Экзодерил® наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и соседние с ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Длительность терапии при дерматомикозах – 2-4 недели (при необходимости – до 8 недель), при кандидозах – 4 недели. При поражении ногтей Экзодерил® наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительностью терапии при онихомикозах – до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов.

Противопоказания

Гиперчувствительность к нафтифину или пропиленгликолю, беременность и период лактации (безопасность и эффективность применения не определены).
Противопоказано нанесение препарата на раневую поверхность.

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи и жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не отмечено взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Особые указания

Меры предосторожности при применении: Препарат Экзодерил® не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и др. механизмами: Экзодерил® не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Срок хранения после открытия

После вскрытия флакона препарат годен к употреблению в течение 6 месяцев.

Условия хранения

Беречь от детей