Инструкция по применению
Экзостат 1% Раствор для наружного применения 15 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Вертекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачный бесцветный или светло-желтый раствор с запахом этанола.

Действующее вещество

Нафтифин

Состав

1 мл раствора содержит: действующее вещество: нафтифина гидрохлорид - 10,0 мг, вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 50,0 мг, этанол 95 % (спирт этиловый 95 %) - 400,0 мг, вода очищенная - до 1 мл.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При наружном применении нафтифин хорошо проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных ее слоях, что делает возможным применение препарата один раз в день.

Показания

Грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea corporis, tinea inquinalis), межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum), грибковые инфекции ногтей (онихомикозы), кандидозы кожи, разноцветный (отрубевидный) лишай, дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него). Препарат эффективен при лечении микозов, поражающих область кожи с гиперкератозом, а также в зонах роста волос.

Способ применения и дозы

Наружно. При поражении кожи Препарат Экзостат8 наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Длительность терапии при дерматомикозах - 2-4 недели (при необходимости до 8 недель), при кандидозах - 4 недели. При поражении ногтей Препарат Экзостат наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах - до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нафтифину или пропиленгликолю, беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность применения не установлены), нанесение на раневую поверхность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Экзостат во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (безопасность и эффективность нафтифина у данной категории пациентов не изучена).

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи (покраснение) и жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не отмечено взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Препарат Экзостат не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза. Пропиленгликоль, входящий в состав раствора, может вызывать раздражение кожи, при появлении побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат Экзостат не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.