Инструкция по применению
Элеутерококка Экстракт жидкий 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Экстракт
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Элеутерококка колючего корневища и корни
Количество в упаковке: 1

Описание

Жидкость темно-коричневого цвета, в тонком слое прозрачная, с характерным запахом. При хранении допускается выпадение осадка.

Действующее вещество

Элеутерококка колючего корневища и корни

Состав

Для приготовления 1000 мл экстракта необходимо: Элеутерококка колючего корневищ и корней - 1000 г, Спирта этилового 40% (этанол) - достаточное количество до получения 1000 мл экстракта

Форма выпуска

Экстракт

Показания

Умственное и физическое переутомление, астенические состояния различной этиологии, неврастения, артериальная гипотензия, период выздоровления после инфекционных заболеваний и послеоперационный период.

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь до еды в первой половине дня. Взрослым назначают по 20-30 капель 2-3 раза в день. Детям старше 12 лет: в дозе из расчета по 1 капле на год жизни. Курс лечения 25-30 дней. При необходимости после консультации с врачом проводят повторные курсы с двухнедельными перерывами (или без них).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), нарушение сердечного ритма, инфаркт миокарда, церебрально-сосудистая, патология, повышенная возбудимость, эпилепсия, бессонница, острые инфекционные заболевания, хронические заболевания печени, беременность, период лактации, возраст до 12 лет. Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Побочные действия

В редких случаях возможны аллергические реакции, тахикардия, головная боль, бессонница, гипогликемия. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При превышении рекомендуемых доз возможно усиление побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препараты элеутерококка усиливают действие стимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин и др.), являются физиологическими антагонистами средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе нейролептиков, барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных препаратов). При одновременном применении с дигоксином возможно повышение его концентрации в плазме крови, с гипогликемическими лекарственными средствами (в т.ч. инсулин) и антикоагулянтами возможно усиление эффекта.

Особые указания

Препарат не следует принимать во второй половине дня во избежание бессонницы. При явлении гипогликемии рекомендуется уменьшить дозу препарата, принимать его после еды или отменить препарат. Максимальная разовая доза препарата содержит 0,47 г абсолютного спирта, максимальная суточная доза препарата - 1,41 г абсолютного спирта.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.