Инструкция по применению
Элеутерококка Экстракт жидкий 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Экстракт
Страна: Россия
Производитель: Дальхимфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Элеутерококка колючего корневища и корни
Количество в упаковке: 1



Описание

Жидкость темно-коричневого цвета, в тонком слое прозрачная, запах своеобразный, специфический. При хранении допускается образование осадка.

Действующее вещество

Элеутерококка колючего корневища и корни

Состав

Элеутерококка корневищ с корнями - 1000 г, Спирта этилового (этанола) 40% - до получения 1 л экстракта

Форма выпуска

Экстракт

Показания

Умственное и физическое переутомление, астенические состояния различной этиологии, артериальная гипотония, период выздоровления после инфекционных заболеваний и послеоперационный период.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь до еды. Взрослым назначают по 20-30 капель 2-3 раза в день. Детям старше 12 лет - в дозе из расчета по 1 капле на год жизни. Курс лечения 25-30 дней. При необходимости проводят повторные курсы с двухнедельными перерывами (или без них) после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), нарушение сердечного ритма, повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, бессонница, острые инфекционные заболевания, хронические заболевания печени. Препарат не рекомендуется применять при беременности, в период лактации и детям до 12 лет.

Побочные действия

В редких случаях возможны аллергические реакции, тахикардия, головная боль. При применении препарата могут наблюдаться нарушение сна и гипогликемия.

Взаимодействие с другими препаратами

Препараты элеутерококка усиливает действие стимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин и др.), являются физиологическими антагонистами снотворного действия средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных препаратов и т.д.)

Особые указания

Препарат не следует принимать во второй половине дня воизбежание нарушения сна. При явлении гипогликемии рекомендуется уменьшить дозу препарата, принимать его после еды или отменить препарат.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.