Инструкция по применению
Эликсир Эвалар 250 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Жидкость коричневого цвета со специфическим запахом. При хранении допускается появление осадка.Уникальное лекарство на основе 18 трав, пантов алтайского марала и меда. Ускоряет выздоровление, дарит энергию и снимает усталость.Эликсир Эвалар — лекарство от усталостиЕсли силы на исходе — попробуйте Эликсир Эвалар! Специалисты ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития России признали Эликсир Эвалар лекарством, повышающим общий тонус организма и жизненную активность. Эликсир Эвалар — универсальный поставщик энергии для повышения физической и умственной работоспособности.Действие:ускоряет выздоровление, дарит энергию и снимает усталость.Одна ложка Эликсира Эвалар в чай или кофе обеспечивает приток энергии в каждую клетку организма. Эликсир Эвалар прекрасно справляется с усталостью и депрессией, повышает умственную и физическую активность, увеличивает выносливость и улучшает работу мозга, помогает быстро восстановиться после перенесенных заболеваний. Начните прием уже сегодня, и вы сразу почувствуете эмоциональный подъем, бодрость и мощный прилив сил. Исчезнут апатия и сонливость, усталость и раздражительность, и появится желание радоваться жизни и наслаждаться каждым прожитым днем.Приготовив чай или кофе, добавьте в него Эликсир Эвалар и почувствуйте незабываемый аромат и восхитительный вкус!

Состав

Для приготовления 1000 мл препарата необходимо:Спирто-водное извлечение из лекарственного растительного сырья (бессмертника песчаного цветки – 1,2 г, боярышника плоды – 2,5 г, зверобоя трава – 1,5 г, кориандра посевного плоды – 1,2 г, ламинарии слоевища (морская капуста) – 2,5 г, рапонтикума сафлоро-видного корневище с корнями – 1,3 г, мяты перечной листья – 1,1 г, подорожника большого листья – 1,9 г, родиолы розовой корневища и корни – 0,8 г, ромашки аптечной цветки – 0,8 г, рябины обыкновенной плоды – 3,0 г, солодки корни – 2,5 г, тысячелистника обыкновенного трава – 1,2 г, шиповника плоды – 5,0 г, элеутерококка колючего корневища и корни – 1,8 г, каштана конского семена – 10,0 г, сосны кедровой сибирской орех – 3,5 г) – 370 г, пантов благородного оленя экстракт – 5,0 мл, клюквенный морс – 79,6 г.Вспомогательные вещества: мед – 35,0 г, сахарный колер – 60,0 г, сахароза – 84,0 г, этанол (спирт этиловый) 95 % – 83 мл, вода – достаточное количество для получения 1000 мл препарата.Бессмертник песчаный – Helichrysum arenarium (L.) Moench., сем. астровых – Asteraceae, боярышник – Crataegus, сем. розоцветных – Rosaceae, зверобой – Hypericum perforatum L., сем. зверобойных – Hypericaceae, кориандр посевной – Coriandrum sativum L. сем. сельдерейных – Apiaceae, ламинария – Laminaria japonica Aresch., Laminaria saccharina (L.) Lam., сем. ламинариевых – Laminariaceae, рапонтикум сафлоровидный (син. левзея сафлоровидная) – Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin (syn. Leuzea carthamoides (Willd.) DC), сем. астровых – Asteraceae, мята перечная – Mentha piperita L., сем. яснотковых – Lamiaceae, подорожник большой Plantago major L., сем. подорожниковых – Plantaginaceae, родиола розовая – Rhodiola rosea L., сем. толстянковых – Crassulaceae, ромашка аптечная – Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Matricaria recutita L., M. chamomilla L.), сем. астровых – Asteraceae, рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L., сем. розоцветных – Rosaceae, солодка – Glycyrrhiza glabra L., Glycyrrhiza uralensis Fisch., сем. бобовых – Fabaceae, тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium L., сем. астровых – Asteraceae, шиповник – Rosa, сем. розоцветных – Rosaceae, элеутерококк колючий – Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., сем. аралиевых – Araliaceae, каштан конский – Aesculus hippocastanum L., сем. конскокаштановых – Hippocastanaceae, сосна кедровая сибирская – Pinus sibirica Du Tour, сем. сосновых – Pinaceae, клюква – Oxycoccus palustris Pers. (O. quadripetalus Gilib.), Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr., сем. брусничных (вересковых) – Vacciniaceae (Ericaceae).

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Действие препарата является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным, все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить метаболиты препарата.

Показания

В качестве тонизирующего средства для повышения физической и умственной работоспособности, в качестве общеукрепляющего средства в комплексной терапии бронхо-легочных заболеваний (острый бронхит, обострения хронического бронхита, воспаление легких), в период реконвалесценции указанных заболеваний, в качестве тонизирующего средства в комплексной терапии при астеническом синдроме (общая слабость, повышенная утомляемость, частая смена настроения, раздражительность, нарушения сна (трудность засыпания, поверхностный сон, раннее пробуждение, сонливость в дневное время)), в послеоперационном периоде у больных с хирургической патологией.

Способ применения и дозы

Эликсир принимают внутрь.2-3 чайные ложки препарата принимают в неразбавленном виде или предварительно растворив в 100 мл воды за 10-15 минут до еды 2 раза в день.Курс лечения составляет 2-3 недели. Проведение повторного курса лечения возможно через 1-2 недели, после консультации с врачом.Разовая доза препарата составляет от 10 до 15 мл (2-3 чайные ложки).Суточная доза препарата составляет 30 мл (6 чайных ложек).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата, острая сердечно-сосудистая недостаточность, почечная недостаточность, нарушения функции печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.Препарат противопоказан к применению до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При появлении указанных выше побочных эффектов, прекратите применение препарата и как можно скорее обратитесь к врачу. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или, Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки не отмечены.

Взаимодействие с другими препаратами

До настоящего времени не установлено клинически значимых взаимодействий препарата при совместном применении его с другими лекарственными средствами.

Особые указания

В связи с тем, что препарат обладает общетонизирующим воздействием на организм, не следует принимать его после 18 часов вечера. При высоком уровне базальной секреции желудочного сока, прием препарата натощак может сопровождаться легкой изжогой или дискомфортом. В этом случае рекомендуется принимать препарат через час после приема пищи.Препарат не назначают одновременно с препаратами, при приеме которых запрещено употребление алкоголя.Содержание этанола в препарате составляет не менее 30%. Разовая доза препарата (2-3 чайные ложки) содержит до 3,55 г абсолютного спирта. Суточная доза препарата (6 чайных ложек) содержит до 7,11 г абсолютного спирта. В период лечения препаратом необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.Не следует превышать указанную суточную дозу. Перед употреблением взбалтывать.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.