
Инструкция по применению
Элюфор Капсулы 200 мг 12 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нифуроксазид
Количество в упаковке: 12
Дозировка действующего вещества: 200 мг



Описание

Твердые желатиновые капсулы № 0. Корпус и крышечка желтого цвета непрозрачные. Содержимое капсул – смесь порошка и гранул желтого цвета. Допускается уплотнение содержимого капсул в комки, которые рассыпаются при надавливании.

Действующее вещество

Нифуроксазид

Состав

Состав на 1 капсулу: Активное вещество: нифуроксазид – 200,0 мг. Вспомогательные вещества: сахароза – 70,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 41,5 мг, крахмал кукурузный – 35,0 мг, магния стеарат – 3,5 мг. Состав корпуса капсулы: краситель хинолиновый желтый – 0,7500%, краситель солнечный закат желтый – 0,0059%, титана диоксид – 2,0000%, желатин – до 100%. Состав крышечки капсулы: краситель хинолиновый желтый – 0,7500%, краситель солнечный закат желтый – 0,0059%, титана диоксид – 2,0000%, желатин – до 100%.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После перорального приема нифуроксазид практически не всасывается из желудочнокишечного тракта и не оказывает системного действия, 99% принятой дозы остается в кишечнике и оказывает там свое противомикробное действие. Нифуроксазид выводится кишечником: 20% в неизмененном виде, а остальное количество нифуроксазида – химически измененным.

Показания

Острая бактериальная диарея, протекающая без ухудшения общего состояния, повышения температуры тела, интоксикации.

Способ применения и дозы

Внутрь. Капсулу следует проглотить целиком, запивая небольшим количеством воды. Взрослым: 1 капсула по 200 мг 4 раза в сутки (интервал между приемами 6 ч). Детям от 6 до 18 лет: 1 капсула по 200 мг 3-4 раза в сутки (интервал между приемами 6-8 ч). Детям от 3 до 6 лет: 1 капсула по 200 мг 3 раза в сутки (интервал между приемами 8 ч). Продолжительность курса лечения 5-7 дней, но не более 7 дней. Если в течение первых 3 дней приема улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нифуроксазиду, производным нитрофурана или любым вспомогательным веществам препарата, детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы), беременность, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

В исследованиях на животных не было выявлено тератогенного эффекта. Однако в качестве меры предосторожности принимать нифуроксазид во время беременности не рекомендуется. Во время периода лактации возможно продолжение грудного вскармливания в случае короткого курса лечения препаратом. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок). Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы передозировки не известны. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременное применение с препаратами, вызывающими развитие дисульфирамоподобных реакций, лекарственными препаратами, угнетающими функцию центральной нервной системы. Если Вы принимаете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Элюфор проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

При лечении диареи одновременно с терапией нифуроксазидом необходимо проводить регидратационную терапию. В случае бактериальной диареи с признаками системного поражения (ухудшение общего состояния, повышение температуры тела, симптомы интоксикации или инфекции) следует обратиться к врачу о решении вопроса о применении противомикробных препаратов системного действия. В суточной дозе препарата 800 мг содержится 0,023 ХЕ. Во время терапии препаратом Элюфор запрещено употребление алкоголя. При появлении симптомов аллергической реакции (в том числе одышка, сыпь, зуд) следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

Срок хранения после открытия

3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.