Инструкция по применению
Элюфор Суспензия 200 мг/ 5 мл 90 мл

Характеристики

Форма выпуска: Суспензия
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нифуроксазид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 200 мг/5 мл



Описание

Суспензия желтого цвета, с характерным запахом. Допускается появление осадка, после взбалтывания образуется однородная суспензия.

Действующее вещество

Нифуроксазид

Состав

В 5 мл суспензии содержится активное вещество: нифуроксазид - 200,0 мг.

Форма выпуска

Суспензия

Фармакокинетика

После перорального применения нифуроксазид практически не всасывается из пищеварительного тракта, и свое антибактериальное действие оказывает исключительно в просвете кишечника. Нифуроксазид выводится кишечником: 20% в неизмененном виде, а остальное количество нифуроксазида - химически измененным.

Показания

Острая бактериальная диарея, протекающая без ухудшения общего состояния, повышения температуры тела, интоксикации.

Способ применения и дозы

Применяется внутрь. Для дозирования используется дозировочная ложка объемом 5 мл, имеющая градуировку 2,5 мл. Перед употреблением суспензию необходимо хорошо встряхнуть. Детям от 1 до 6 месяцев: 100 мг (2,5 мл) 2-3 раза в сутки (интервал между приемами 8-12 часов). Детям от 6 месяцев до 3 лет: 100 мг (2,5 мл) 3 раза в сутки (интервал между приемами 8 часов). Детям от 3 до 6 лет: 200 мг (5 мл) 3 раза в сутки (интервал между приемами 8 часов). Детям от 6 до 18 лет: 200 мг (5 мл) 3-4 раза в сутки (интервал между приемами 6-8 часов). Взрослым: 200 мг (5 мл) 4 раза в сутки (интервал между приемами 6 часов). Продолжительность курса лечения 5-7 дней, но не более 7 дней. Если в течение первых 3 дней приема улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нифуроксазиду, производным нитрофурана или любым вспомогательным веществам препарата, • непереносимость фруктозы, • синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточность сахаразы и изомальтазы, • беременность, • период новорожденности (до 1 месяца), недоношенность.

Особые указания

При лечении диареи одновременно с терапией нифуроксазидом необходимо проводить регидратационную терапию. Лечение диареи у детей до 3 лет следует проводить под наблюдением врача. В случае бактериальной диареи с признаками системного поражения (ухудшение общего состояния, повышение температуры тела, симптомы интоксикации или инфекции/следует обратиться к врачу для решения вопроса о применении противомикробных препаратов системного действия. В связи с содержанием метилпарагидроксибензоата препарат может вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные). Во время терапии препаратом Элюфор запрещено употребление алкоголя. При появлении симптомов аллергической реакции (в том числе одышка, сыпь, зуд) следует прекратить прием препарата. Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами: Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.