Инструкция по применению
Элькар Гранулы шипучие для приготовления раствора для приема внутрь 1000 мг 5 г пакетики 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Гранулы
Страна: Россия
Производитель: ПИК-Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левокарнитин
Количество в упаковке: 10



Описание

Гранулы шипучие для приготовления раствора для приема внутрь белые или белые с желтоватым оттенком, со слабым лимонным запахом, после растворения гранул образуется бесцветный или с желтоватым оттенком слабо опалесцирующий раствор со слабым лимонным запахом.

Действующее вещество

Левокарнитин

Состав

Левокарнитин, лимонная кислота безводная - 2750 мг, натрия карбонат безводный - 1100 мг, ароматизатор лимонный - 100 мг, ацесульфам калия - 35 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 15 мг.

Форма выпуска

Гранулы

Показания

Микропедиатрия и педиатрия: гипотрофия, гипотония, адинамия, последствия родовой травмы и асфиксии, состояния после тяжелых заболеваний и операций. Психиатрия и неврология: неврогенная анорексия, физическое истощение, травматическая энцефалопатия. Гастроэнтерология: хронический гастрит с пониженной секреторной функцией, хронический панкреатит с пониженной внешнесекреторной функцией. Эндокринология: задержка роста у детей до 16 лет, легкие формы тиреотоксикоза. Дерматология: псориаз, себорейная экзема, склеродермия.

Способ применения и дозы

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к левокарнитину.

Побочные действия

Возможно: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, аллергические реакции, мышечная слабость (у пациентов с уремией), при быстром введении (80 капель/мин и более) возможно возникновение болей по ходу вены, проходящих при снижении скорости введения.Редко: специфический запах от тела.