Инструкция по применению
Эльмуцин капсулы 300 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Оболенское ФП
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эрдостеин
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 300 мг

Описание

Муколитический препарат

Действующее вещество

Эрдостеин

Состав

p3-sredstva-ot-kashlya

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Быстро абсорбируется из ЖКТ. Повторное применение или одновременный прием пищи не влияют на фармакокинетические параметры. Cmax - 3.46 мкг/мл, Tmax - 1.48 ч, AUC 0-24 ч - 12.09. Связывание с белками плазмы составляет 64.5%. етаболизируется в печени до трех активных метаболитов, наиболее важный из которых - N-тиодигликолил-гомоцистеин (Метаболит 1 или M1). T1/2 - более 5 ч. Выводится в виде неорганических сульфатов почками и через кишечник. В случае нарушения функции печени отмечается увеличение значений Cmax и AUC. Возможно увеличение T1/2 при выраженном нарушении функции печени. При почечной недостаточности возможна кумуляция метаболитов.

Показания

Заболевания дыхательных путей с образованием вязкой мокроты: острый и хронический бронхит, пневмония, ХОБЛ, бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты, бронхоэктатическая болезнь, профилактика пневмонии и ателектаза легких после хирургических вмешательств.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь. Рекомендуемая доза - по 300 мг 2-3 раза/сут. При отсутствии улучшения в течение 5 дней после начала применения препарата или при ухудшении состояния пациенту необходимо обратится к лечащему врачу.

Противопоказания

Нарушение функции печени, почечная недостаточность (КК <25 мл/мин), гомоцистеинурия (препарат является источником гомоцистеина, поэтому возможны нарушения метаболизма аминокислот у пациентов, соблюдающих диету со сниженным содержанием свободного метионина), I триместр беременности, период лактации (грудного вскармливания), детский и подростковый возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к эрдостеину.

Применение при беременности и кормлении грудью

эрдостеин 300 мг Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 13 мг, повидон (К-30) - 8 мг, магния стеарат - 3 мг. Капсулы твердые желатиновые: корпус и крышечка капсулы - титана диоксид - 1.3333%, краситель хинолиновый желтый - 0.9197%, краситель солнечный закат желтый - 0.0044%, желатин - до 100%.

Передозировка

При нерациональном применении противокашлевой терапии возможно скопление жидкого секрета в бронхах и увеличение риска развития суперинфекции или бронхоспазма. При почечной недостаточности возможна кумуляция метаболитов. При выраженном нарушении функции печени возможно увеличение T1/2.

Взаимодействие с другими препаратами

Со стороны пищеварительной системы: редко - изжога, тошнота, диарея, очень редко - в начале лечения возможна утрата или изменение вкусовой чувствительности. Аллергические реакции: редко - покраснение кожи, крапивница.

Особые указания

Применение в I триместре беременности и в период лактации (грудного вскармливания) противопоказано. Применение во II и III триместрах беременности возможно только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца.

Условия хранения

Беречь от детей, При комнатной температуре