Инструкция по применению
Элоком Лосьон для наружного применения 0,1 % 30 мл

Характеристики



Форма выпуска: Лосьон
Страна: Канада
Производитель: МСД ФАРМАСЬЮТИКАЛС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Мометазон
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,1%
Срок годности: 36

Действующее вещество

Мометазон

Состав

Действующее вещество: МометазонКонцентрация действующего вещества (%): 0,1%

Форма выпуска

Лосьон

Фармакокинетика

Абсорбция Элокома Лосьона (0.1% раствор для наружного применения) незначительна. Через 8 ч после нанесения на неповрежденную кожу (без окклюзионной повязки) в системном кровотоке обнаруживается около 0.7%.

Показания

Препарат применяют при кожных заболеваниях требующих терапии глюкокортикостероидами, в том числе:- симптоматическое лечение воспаления и зуда при кожных и аллергических заболеваниях;- лечение псориаза, атопического и себорейного дерматита;- красный плоский лишай, радиационный лучевой дерматит.

Способ применения и дозы

Мазь, крем:Препарат применяют 1 раз в сутки. Мазь или крем наносят тонким слоем на пораженный участок кожи. Курс лечения определяют индивидуально для каждого пациента в зависимости от тяжести заболевания.Лосьон:Лосьон наносят на пораженные участки, в том числе на кожу головы 1 раз в сутки. Для нанесения препарат флакон подносят к пораженному участку кожи и несколько сжимают, после нанесения нескольких капель лосьона его легко втирают в кожу до полного впитывания. Курс лечения препаратом Элоком зависит от тяжести заболевания.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.Препарат не применяют в офтальмологической практике.

Применение при беременности и кормлении грудью

Запрещено использование данного средства во время беременности для лечения обширных участков кожи и/или длительное лечение.Запрещено использование данного средства в период лактации (применение в больших дозах или/и в течение длительного времени).

Побочные действия

При местном применении препарата у пациентов отмечались такие побочные эффекты как жжение, зуд, кожная сыпь и парестезии. При длительном применении препарата Элоком у некоторых пациентов отмечалось развитие атрофии кожи. Крайне редко возникали такие эффекты как обострение кожных заболеваний, фурункулез, эритема и тошнота.Не исключено также проявление побочных эффектов характерных для всех топических глюкокортикостероидов, в том числе сухость кожных покровов, гипертрихоз, снижение количества кожных пигментов, вторичные инфекции и стрии. При длительном применении, особенно у пациентов в возрасте до 18 лет, возможно развитие системных побочных эффектов, в том числе угнетение продукции гормонов корой надпочечников.При появлении каких-либо побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обратится к врачу.

Передозировка

Симптомы: угнетение функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, включая вторичную надпочечниковую недостаточность.Лечение: симптоматическое, при необходимости - коррекция электролитного дисбаланса, отмена препарата (при длительной терапии - постепенная отмена).

Взаимодействие с другими препаратами

Соответствующих данных не имеется.

Особые указания

При нанесении на большие участки кожи в течение длительного времени, особенно при применении окклюзионных повязок, возможно развитие системного действия ГКС. Учитывая это больные должны наблюдаться в отношении признаков подавления функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и развития синдрома Кушинга.Следует избегать попадания Элокома Лосьона в глаза.Пропиленгликоль, входящий в состав препарата может вызывать раздражение в месте нанесения, а изопропанол - ощущение жжения при попадании на воспаленную кожу. В таких случаях следует прекратить применение Элокома Лосьона и назначить соответствующее лечение.Следует учитывать, что ГКС способны изменять проявления некоторых заболеваний кожи, что может затруднить постановку диагноза. Кроме того, применение ГКС может быть причиной задержки заживления ран.При длительной терапии ГКС внезапное прекращение терапии может привести к развитию синдрома рикошета, проявляющегося в форме дерматита с интенсивным покраснением кожи и ощущением жжения. Поэтому после длительного курса лечения отмену препарата следует производить постепенно, например, переходя на интермиттирующую схему лечения перед тем, как его полностью прекратить.Использование в педиатрииБезопасность и эффективность мометазона фуроата при местном применении у детей в течение периода, превышающего 6 недель, не изучались. Сведения о безопасности и эффективности применения у детей в возрасте до 2 лет ограничены.В связи с тем, что у детей величина соотношения площади поверхности и массы тела больше, чем у взрослых, дети подвержены большему риску подавления функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и развития синдрома Кушинга при применении любых ГКС местного действия.Длительное ГКС лечение детей может привести к нарушениям их роста и развития.Дети должны получать минимальную дозу препарата, достаточную для достижения эффекта.

Условия хранения

В сухом месте