**Инструкция по применению**
**Элоком мазь 0,1% 15 г**

## Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: МСД ФАРМАСЬЮТИКАЛС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Мометазон
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,1%
Срок годности: 24




## Действующее вещество

Мометазон

## Состав

Действующее вещество: МометазонВспомогательные вещества: гексиленгликоль, вода очищенная, фосфорная кислота (для установки pH), пропиленгликоля стеарат, спирт стеариловый и макрогола цетостеарат (Цетеарет-20), титана диоксид, алюминия крахмала октенилсукцинат, воск пчелиный белый, вазелин.Концентрация действующего вещества (мг): 1 мг

## Форма выпуска

Мазь

## Фармакокинетика

Абсорбция лекарственного средства при наружном применении незначительна. Через 8 ч после нанесения на неповрежденную кожу (без окклюзионной повязки) в системном кровотоке обнаруживается 0.7% мометазона.

## Показания

Воспалительные явления и зуд при дерматозах, поддающихся глюкокортикостероидной терапии

**Способ применения и дозы**

Наружно.Тонкий слой крема или мази ЭЛОКОМ наносят на пораженные участки кожи один раз в день. Продолжительность курса лечения определяется его эффективностью, а также переносимостью пациентом, наличием и выраженностью побочных эффектов.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата или к ГКС. Розовые угри, периоральный дерматит.Бактериальная, вирусная (Herpes simplex, ветряная оспа, Herpes zoster) или грибковая инфекция кожи. Туберкулез, сифилис. Поствакцинальные реакции.Беременность (лечение обширных участков кожи, длительное лечение).Период лактации (применение в больших дозах или/и в течение длительного времени).

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Безопасность применения мометазона фуроата при беременности и в период лактации не изучена.ГКС проникают через плацентарный барьер. Следует избегать длительного лечения и применения в высоких дозах при беременности в связи с риском негативного воздействия на развитие плода.ГКС выделяются с грудным молоком. При необходимости применения ГКС в высоких дозах и/или в течение длительного времени, следует прекратить грудное вскармливание.

**Побочные действия**

Редко - раздражение и сухость кожи, ощущение жжения, зуд, фолликулит, гипертрихоз, угревая сыпь, гипопигментация, периоральный дерматит, аллергический контактный дерматит, мацерация кожи, присоединение вторичной инфекции, признаки атрофии кожи, стрии, потница. Менее чем в 1% случаев - образование папул, пустул.При применении наружных форм ГКС в течение длительного времени и /или для лечения больших участков кожи, или с использованием окклюзионных повязок, особенно у детей и подростков, могут возникнуть побочные эффекты, характерные для ГКС системного действия, включая надпочечниковую недостаточность и синдром Кушинга.

**Передозировка**

Симптомы: угнетение функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, включая вторичную надпочечниковую недостаточность.Лечение: симптоматическое, при необходимости - коррекция электролитного дисбаланса, отмена препарата (при длительной терапии - постепенная отмена).

**Взаимодействие с другими препаратами**

Какого-либо взаимодействия препарата Элоком с другими лекарственными средствами не зарегистрировано.

**Особые указания**

При применении на больших участках кожи в течение длительного времени, особенно при использовании окклюзионных повязок, возможно развитие системного действия ГКС. Учитывая это, пациенты должны наблюдаться для выявления признаков подавления функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и развития синдрома Кушинга.Следует избегать попадания препарата в глаза.В состав мази Элоком входит пропиленгликоля стеарат, который может вызвать раздражение в месте нанесения. В таких случаях следует прекратить применение препарата и назначить соответствующее лечение.Следует учитывать, что ГКС способны изменять проявления некоторых заболеваний кожи, что может затруднить постановку диагноза. Кроме того, применение ГКС может быть причиной задержки заживления ран.При длительной терапии ГКС внезапное прекращение терапии может привести к развитию синдрома рикошета, проявляющегося в форме дерматита с интенсивным покраснением кожи и ощущением жжения. Поэтому после длительного курса лечения отмену препарата следует производить постепенно, например, переходя на интермиттирующую схему лечения перед тем, как его полностью прекратить.Любой из побочных эффектов, описанный при системном применении ГКС, включая подавление функции надпочечников, может возникнуть и при местном применении, особенно у детей.Использование в педиатрииВ связи с тем, что у детей величина соотношения площади поверхности и массы тела больше, чем у взрослых, дети подвержены большему риску подавления функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и развития синдрома Кушинга при применении любых ГКС местного действия.Длительное применение ГКС у детей может привести к нарушениям их роста и развития.Детям следует назначать минимальную дозу препарата, достаточную для достижения эффекта.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВлияние препарата Элоком на способность к управлению автотранспортом или движущимися механизмами не отмечено.

**Условия хранения**

В сухом месте