Инструкция по применению
Элтацин Таблетки подъязычные 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Россия
Производитель: Биотики
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Глутаминовая кислота
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 36.0

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Глутаминовая кислота

Состав

Действующие вещества: глицин – 70 мг, глутаминовая кис- лота – 70 мг, цистин – 70 мг; вспомогательные вещества: метилцеллюлоза – 7,8 мг, магния стеарат – 2,2 мг.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Фармакокинетика

Глицин проникает в большинство биологических жидкостей и тканей организма, в т.ч. в головной мозг, не накапливается в тканях, метаболизируется до воды и углекислого газа. При приеме глутаминовая кислота хорошо всасывается, проникает через гематоэнцефалический барьер и клеточные мембраны. Утилизируется в процессе метаболизма, 4–7% выводится почками в неизмененном виде. После приема концентрация цистина постепенно увеличивается, достигла максимума через 30 мин, а затем медленно уменьшается, не накапливается, не токсичен.

Показания

Синдром вегетативной дисфункции у детей в возрасте от 12 лет.Хроническая сердечная недостаточность I-III функционального класса по классификации NYHA у взрослых (на фоне стандартной терапии).Хроническая сердечная недостаточность I-II функционального класса по классификации NYHA у детей в возрасте от 12 до 18 лет (на фоне стандартной терапии).Профилактика хронического физического перенапряжения и восстановление после интенсивных физических нагрузок при занятии спортом у детей в возрасте от 11 до 15 лет.

Способ применения и дозы

Подъязычно. Таблетку можно также разжевать и подержать во рту под языком до полного растворения. Синдром вегетативной дисфункции у взрослых и детей в возрасте от 12 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки подъязычно, курс лечения от 1 до 3 месяцев в зависимости от тяжести заболевания, повторные курсы назначаются по рекомендации врача. Профилактика хронического физического перенапряжения у детей в возрасте от 11 до 15 лет: по 1 таблетке 2 раза в день в течение 2–3 недель. В период восстановления после интенсивных физических нагрузок при занятии спортом у детей в возрасте от 11 до 15 лет: по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2 недель. Хроническая сердечная недостаточность I–III функционального класса по классификации NYHA у взрослых: по 1 таблетке 3 раза в сутки подъязычно, курс лечения от 1 до 3 месяцев в зависимости от тяжести заболевания, повторные курсы назначаются по рекомендации врача. Хроническая сердечная недостаточность I–II функционального класса по классификации NYHA у детей в возрасте от 12 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки подъязычно, курс лечения от 1 до 3 месяцев в зависимости от тяжести заболевания, повторные курсы назначаются по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 11 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Отдельных исследований не проводилось. Не рекомендуется использовать при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаев передозировки не выявлено.

Взаимодействие с другими препаратами

Можно принимать одновременно с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), бета-адреноблокаторами, диуретическими средствами, антагонистами альдостерона, органическими нитратами и блокаторами « медленных» кальциевых каналов.

Особые указания

Можно принимать одновременно с ингибиторами АПФ, бета-адреноблокаторами, диуретическими средствами, антагонистами альдостерона, органическими нитратами и блокаторами медленных кальциевых каналов.

Условия хранения

В сухом месте