Инструкция по применению
Элтуфлоп Био Раствор для инъекций Ампулы 2 мл 5 шт

Характеристики

Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Россия
Производитель: Эллара
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Биоактивный экстракт из мелкой морской рыбы
Количество в упаковке: 5



Описание

Прозрачный раствор от светло-желтого до коричневого цвета с характерным запахом. Активным компонентом препарата является биоактивный экстракт из мелкой морской рыбы [шпрот европейский (Sprattus sprattus) семейства сельдевых, мерланг черноморский (Odontogadus merlangus euxinus) семейства тресковых, пузанок черноморский (Alosa tanaica) семейства сельдевых, анчоус европейский (Engraulis encrassicholus) семейства анчоусовых], полученный путем экстракции с последующей депротеинизацией и делипидизацией.

Действующее вещество

Биоактивный экстракт из мелкой морской рыбы

Состав

Состав (на 1 мл)Действующее вещество:Биоактивный экстракт из мелкой морской рыбы – 50 ЕДВспомогательные вещества:Фенол – до 5,0 мгВода для инъекций – до 1,0 мл

Форма выпуска

Раствор для инъекций

Показания

ЭЛТУФЛОП® БИО применяют у взрослых при первичном и вторичном остеоартрозе различной локализации (коксартрозе, гонартрозе, артрозе мелких суставов), остеохондрозе и спондилезе.

Способ применения и дозы

При полиостеоартрозе и остеохондрозе препарат вводят глубоко внутримышечно по 1 мл в день. Курс лечения составляет 20 инъекций (по 1 инъекции в день в течение 20 дней) или по 2 мл через день, курс лечения составляет 10 инъекций (по 1 инъекции через день в течение 20 дней)При преимущественном поражении крупных суставов препарат вводят внутрисуставно по 1-2 мл в каждый сустав с интервалом 3-4 дня. Всего на курс 5-6 инъекций в каждый сустав.Возможно сочетание внутрисуставного и внутримышечного методов введения.Курс лечения целесообразно повторить через 6 месяцев после консультации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.Беременность и период грудного вскармливания.Детский возраст до 18 лет (из-за отсутствия клинических данных у данной категории пациентов).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания. При необходимости применения препарата грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

Побочные действия

Побочные эффекты сгруппированы в соответствии с классификацией частоты развития нежелательных реакций ВОЗ: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до Редко: зудящий дерматит, покраснение кожи или ощущение жжения в месте введения препарата, кратковременные миалгии.Очень редко: развитие анафилактических реакций.Частота неизвестна: при внутрисуставных инъекциях возможно преходящее усиление болевого синдрома.

Передозировка

При передозировке усиливаются дозозависимые нежелательные лекарственные реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

До настоящего времени не выявлены.

Особые указания

В случае индивидуальной непереносимости морепродуктов (морская рыба) возрастает риск развития аллергических реакций.Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмамиПрименение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.