Инструкция по применению
Элюфор Капсулы 200 мг 18 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нифуроксазид
Количество в упаковке: 18
Дозировка действующего вещества: 200 мг

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 0. Корпус и крышечка желтого цвета непрозрачные. Содержимое капсул - смесь порошка и гранул желтого цвета. Допускается уплотнение содержимого капсул в комки, которые рассыпаются при надавливании.

Действующее вещество

Нифуроксазид

Состав

1 капсула содержит: _Действующее вещество:_ нифуроксазид - 200,0 мг. _Вспомогательные вещества_: сахароза - 70,0 мг; целлюлоза микрокристаллическая (МКЦ-101) - 41,5 мг; крахмал кукурузный - 35,0 мг; магния стеарат - 3,5 мг. _Состав корпуса капсулы:_ краситель хинолиновый желтый - 0,7500 %; краситель солнечный закат желтый - 0,0059 %; титана диоксид - 2,0000 %; желатин - до 100 %. _Состав крышечки капсулы:_ краситель хинолиновый желтый - 0,7500 %; краситель солнечный закат желтый - 0,0059 %; титана диоксид - 2,0000 %; желатин - до 100 %.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После перорального приема нифуроксазид практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта и свое антибактериальное действие оказывает исключительно в просвете кишечника. Нифуроксазид выводится кишечником: 20% в неизмененном виде, а остальное количество нифуроксазида - химически измененным.

Показания

Острая бактериальная диарея, протекающая без ухудшения общего состояния, повышения температуры тела, интоксикации.

Способ применения и дозы

Внутрь. Капсулу следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды. Взрослым: по 200 мг (1 капсула) 4 раза в сутки (интервал между приемами 6 ч). Детям от 6 до 18 лет: по 200 мг (1 капсула) 3-4 раза в сутки (интервал между приемами 6-8 ч). Детям от 3 до 6 лет: по 200 мг (1 капсула) 3 раза в сутки (интервал между приемами 8 ч). Продолжительность курса лечения 5-7 дней, но не более 7 дней. Если в течение первых 3 дней приема улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

* Повышенная чувствительность к нифуроксазиду, производным нитрофурана или любым вспомогательным веществам препарата; * детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы); * беременность; * дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

В исследованиях на животных не было выявлено тератогенного эффекта. Прием нифуроксазида во время беременности противопоказан (недостаточный клинический опыт применения при беременности). Во время периода лактации возможно продолжение грудного вскармливания в случае короткого курса лечения препаратом. Перед применением препарата, если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, или Вы находитесь в периоде грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок). Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы передозировки не известны. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременное применение с препаратами, вызывающими развитие дисульфирамоподобных реакций (боль в животе, тошнота, рвота, головная боль, тахикардия, нечеткость зрения, слабость, судороги), лекарственными препаратами, угнетающими функцию центральной нервной системы. Если Вы принимаете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Элюфор проконсультируйтесь с врачом.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.