Инструкция по применению
Эметрон таблетки 8 мг 10 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Венгрия
Производитель: Гедеон Рихтер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ондансетрон
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 8 мг

Действующее вещество

Ондансетрон

Состав

1 таб.ондансетрона гидрохлорида дигидрат10 мг,что соответствует содержанию ондансетрона8 мг Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный - 0.6 мг, магния стеарат - 1.3 мг, тальк - 7.1 мг, крахмал прежелатинизированный - 18 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 40 мг, крахмал кукурузный - 54.5 мг, лактозы моногидрат - 118.5 мг. Состав оболочки: кремния диоксид коллоидный - 0.07 мг, краситель железа оксид желтый - 0.12 мг, титана диоксид - 0.27 мг, макрогол 6000 - 0.79 мг, сепифильм 003 - 8.75 мг (макрогола-40 стеарат (моно и диэфиры стеариновой кислоты и ПЭГ-40) (Е431) - 8-12%, целлюлоза микрокристаллическая (Е460) - 35-45%, гипромеллоза (Е464) - 45-55%). 10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь ондансетрон хорошо всасывается из ЖКТ. Подвергается эффекту "первого прохождения" через печень. Связывание с белками высокое (70-76%). Биотрансформируется в печени, главным образом путем гидроксилирования. Средний T1/2 у взрослых пациентов около 4 ч. При нарушении функции печени отмечается увеличение T1/2.

Показания

Профилактика тошноты и рвоты при проведении противоопухолевой химио- или лучевой терапии, профилактика и лечение тошноты и рвоты в послеоперационном периоде.

Способ применения и дозы

Индивидуальный, в зависимости от показаний и схемы лечения.

Противопоказания

I триместр беременности, повышенная чувствительность к ондансетрону.

Применение при беременности и кормлении грудью

Ондансетрон противопоказан к применению в I триместре беременности. При необходимости применения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.Применение при нарушениях функции печениПри применении у пациентов с умеренными и выраженными нарушениями функции печени не рекомендуют превышать дозу 8 мг/сут.

Побочные действия

Со стороны ЦНС: головные боли, редко - транзиторные нарушения зрения и головокружение (при быстром в/в введении), непроизвольные движения.Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко - боли в груди, аритмии, брадикардия, артериальная гипотензия.Со стороны пищеварительной системы: запоры, диарея, боли в животе, транзиторное повышение уровня трансаминаз в сыворотке крови. Аллергические реакции: редко - бронхоспазм, ангионевротический отек, крапивница, в отдельных случаях - анафилактические реакции.Прочие: ощущение тепла и прилива крови к голове и эпигастральной области.

Взаимодействие с другими препаратами

В связи с тем, что ондансетрон метаболизируется в печени изоферментами системы цитохрома Р450, при одновременном применении с лекарственными средствами, являющимися индукторами или ингибиторами этой ферментной системы, возможны изменения клиренса и Т1/2 ондансетрона.

Особые указания

При применении у пациентов с умеренными и выраженными нарушениями функции печени не рекомендуют превышать дозу 8 мг/сут.С осторожностью используют ондансетрон при хирургических вмешательствах на брюшной полости, т.к. его применение может маскировать прогрессирующую кишечную непроходимость.