Инструкция по применению
Эмокси-Оптик Капли глазные 1 % 5 мл 1 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Синтез
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Метилэтилпиридинол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.01
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Метилэтилпиридинол

Состав

1 мл капель глазных содержит: действующее вещество: метилэтилпиридинола гидрохлорид 10 мг; вспомогательные вещества: натрия сульфит (натрия сульфит безводный), натрия бензоат, калия дигидрофосфат (калия фосфат однозамещенный), натрия гидрофосфат додекагидрат (натрия фосфат двузамещенный 12-водный), метилцеллюлоза, вода для инъекций.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Быстро проникает в органы и ткани, где происходит его депонирование и метаболизм. В тканях глаза концентрация выше, чем в крови. Обнаружено 5 метаболитов, представленных деалкилированными и конъюгированными продуктами превращения. Метаболиты экскретируются почками. В значительных количествах в печени обнаруживается 2-этил-6-метил-3-оксипиридин-фосфат.

Показания

Применяется у взрослых при следующих заболеваниях и состояниях: кровоизлияния в переднюю камеру глаза (лечение); кровоизлияния в склеру у лиц пожилого возраста (лечение и профилактика); воспаления и ожоги роговицы (лечение и профилактика); осложнения при близорукости (лечение); защита роговицы (при ношении контактных линз).

Способ применения и дозы

Эмокси-оптик закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2-3 раза в день. Курс лечения 3-30 дней. При необходимости и хорошей переносимости курс лечения может быть продолжен до 6 месяцев и может повторяться 2-3 раза в год.

Противопоказания

Гиперчувствительность. Беременность. Период лактации (грудного вскармливания), детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания). Применение у детей Противопоказание: детский и подростковый возраст до 18 лет.

Побочные действия

Ощущение жжения, зуд, кратковременная гиперемия конъюнктивы, редко - местные аллергические реакции.

Передозировка

Передозировка не установлена.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат Эмокси-оптик не следует смешивать с другими лекарственными средствами.

Особые указания

При необходимости одновременного применения других глазных капель препарат закапывают последним, после полного всасывания предшествующих капель (не менее чем через 10-15 минут).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении