Инструкция по применению
Эмоксипин Фармстандарт Капли глазные 1 % 5 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Метилэтилпиридинол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%



Описание

Бесцветная или слабоокрашенная, слегка опалесцирующая жидкость.

Действующее вещество

Метилэтилпиридинол

Состав

1 мл раствора содержит: Действующее вещество: Метилэтилпиридинола гидрохлорид - 10,0 мг. Вспомогательные вещества: Натрия сульфит - 2,5 мг, натрия бензоат - 2,0 мг, калия дигидрофосфат - 5,4 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат - 6,5 мг, метилцеллюлоза водорастворимая - 6,5 мг, вода для инъекций - до 1 мл.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Препарат быстро проникает в ткани глаза, где происходит его депонирование и метаболизм. В тканях глаза концентрация выше, чем в крови. Обнаружено 5 метаболитов, представленных дезалкилированными и конъюнгированными продуктами его превращения. Метаболизируется в печени: Метаболиты выводятся почками. Связывается с белками плазмы крови в среднем на 42%.

Показания

лечение и профилактика воспалений и ожогов роговицы, лечение кровоизлияний в переднюю камеру глаза, лечение и профилактика кровоизлияний в склеру у лиц пожилого возраста, тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, лечение осложнений близорукости, диабетическая ретинопатия.

Способ применения и дозы

Препарат закапывают в конъюнктивальную полость по 1-2 капли 2-3 раза в день. Продолжительность курса лечения зависит от течения заболевания (обычно составляет 3-30 дней) и определяется врачом. При наличии показаний и хорошей переносимости препарата курс лечения может быть продолжен до 6 месяцев или повторяться 2-3 раза в год.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан во время беременности и в период лактации.

Побочные действия

Возможно ощущение жжения, зуд, кратковременная гиперемия конъюнктивы, редко - местные аллергические реакции.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата (при закапывании в конъюнктивальный мешок) не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат не следует смешивать с другими лекарственными растворами.

Особые указания

При необходимости одновременного применения других глазных капель, препарат закапывают последним, после полного всасывания предыдущего лекарственного средства (не ранее, чем через 15 минут). При встряхивании образует на поверхности пену из-за наличия в составе метилцеллюлозы. Непроизвольное встряхивание может произойти при транспортировке препарата. Пенообразование не влияет на качество препарата, пена исчезает через непродолжительное время. Инструкция по применению крышки-капельницы: Снять с флакона алюминиевый колпачок и резиновую пробку, используя ножницы. Надеть на флакон полиэтиленовую крышку-капельницу, которая прилагается к флакону, предварительно сняв с нее упаковку. Перевернуть флакон вверх дном и закапать капли, нажав на корпус крышки-капельницы. Закрыть крышку-капельницу маленьким колпачком, надорвав три перепонки в нижней части крышки-капельницы.

Срок хранения после открытия

Срок годности препарата после вскрытия &mdash, 1 месяц.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.