Инструкция по применению
Энтерофурил Капсулы 200 мг 16 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Босния и Герцеговина
Производитель: Босналек
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нифуроксазид
Количество в упаковке: 16
Дозировка действующего вещества: 1 капсула
содержит: нифуроксазид 200,00 мг
Срок годности: 5 лет



Действующее вещество

Нифуроксазид

Состав

Нифуроксазид 200,00 мгВспомогательные вещества:Сахароза 68,00 мг, крахмал кукурузный 65,90 мг, целлюлоза микрокристаллическая 9,00 мг, магния стеарат 7,10 мг;Состав оболочки капсулы (%): титана диоксид (Е 171) -2,95, краситель железа оксид желтый (Е 172) — 1,00, желатин — q.s. до 100.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После перорального применения нифуроксазид практически не всасывается из пищеварительного тракта и свое антибактериальное действие оказывает исключительно в просвете кишечника. Нифуроксазид выводится кишечником: 20% в неизмененном виде, а остальное количество нифуроксазида - химически измененным.

Показания

Острая бактериальная диарея, протекающая без ухудшения общего состояния, повышения температуры тела, интоксикации.

Способ применения и дозы

Применяется внутрь.Детям от 3 до 6 лет: 200 мг нифуроксазида (1 капсула) 3 раза в сутки (интервал между приемами 8 ч);Детям от 6 до 18 лет: 200 мг нифуроксазида (1 капсула) 3 - 4 раза в сутки (интервал между приемами 6 - 8 ч);Взрослым: 200 мг нифуроксазида (1 капсула) 4 раза в сутки (интервал между приемами 6 ч). Продолжительность курса лечения 5-7 дней, но не более 7 дней. Если в течение первых 3 дней приема улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нифуроксазиду, к производным нитрофурана и другим компонентам препарата, беременность, детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы), непереносимость фруктозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, недостаточность сахаразы и изомальтазы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Энтерофурил при беременности возможно только в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода. Энтерофурил не абсорбируется из желудочно-кишечного тракта и не попадает в системное кровообращение, однако применение препарата в период лактации возможно только по строгим показаниям, при этом следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции: сыпь, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок.Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота.

Передозировка

Препарат не абсорбируется из желудочно-кишечного тракта и не попадает в системное кровообращение. Симптомы передозировки не известны. В случае превышения дозы рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременное применение с препаратами, вызывающими развитие дисульфирамоподобных реакций, лекарственными препаратами, угнетающими функцию центральной нервной системы.Если Вы принимаете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Энтерофурил проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

При лечении диареи одновременно с терапией препаратом Энтерофурил необходимо проводить регидратационную терапию (пероральную или в/в) в соответствии с состоянием пациента и интенсивностью диареи.Во время терапии препаратом Энтерофурил запрещено употребление алкоголя, т.к. он повышает чувствительность организма к нифуроксазидуПри появлении симптомов повышенной чувствительности (одышка, сыпь, зуд) следует прекратить прием препарата.До назначения препарата необходимо исключить у пациентов (в т.ч. у грудных детей) врожденный дефицит ферментов, расщепляющих сахарозу.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПрепарат не влияет на психомоторную деятельность и способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

Условия хранения

Беречь от детей