Инструкция по применению
Энтерокинд Капли для приема внутрь 20 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: Альпен Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Гомеопатическое средство

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Chamomilla recutita (Chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла)) D6 10 гArtemisia cina (Cina) (артемизиа цина (цина)) D6 10 гCitrullus colocynthis (Colocynthis) (цитрулюс колоцинтис (колоцинтис)) D6 10 гLac bovinum defloratum (Lac defloratum) (лак бовинум дефлоратум (лак дефлоратум)) D6 10 гMagnesium chloratum (магнезиум хлоратум) D6 10 гВспомогательные вещества: глицерол 85% - 35.294 г, ксилитол - 5 г, вода очищенная - 9.706 г.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата не изучена.

Показания

применяется для лечения "детской" колики и метеоризма у детей грудного и младшего возраста.

Способ применения и дозы

При отсутствии иных указаний Энтерокинд применяют следующим образом: Дети от 0 до 6 лет: при острых симптомах по 3 капли через каждый час, но не более 6 раз в день, после ослабления симптоматики по 3 капли 3 раза в день. Капли рекомендуется принимать за полчаса до или через полчаса после еды. Постарайтесь заставить ребенка подержать капли немного во рту, прежде чем проглотить их. При лечении грудных детей капли можно смешивать с приблизительно 20 мл (2-е столовые ложки)) кипяченой и охлажденной воды.

Противопоказания

Гиперчувствительность к одному из компонентов препарата Энтерокинд.

Применение при беременности и кормлении грудью

Для детей

Побочные действия

Аллергические реакции к одному из компонентов препарата Если Вы заподозрите, что у Вашего ребенка появляются признаки побочного эффекта после приема препарата Энтерокинд, информируйте об этом вашего врача или фармацевта.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.Симптомы: при случайной передозировке возможны тошнота, рвота, диарея, раздражение слизистой оболочки ЖКТ.Лечение: проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Не установлены Информируйте Вашего врача или фармацевта, если Ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие лекарственные средства. Это касается также медикаментов, которые можно приобрести без рецепта.

Особые указания

В данном лекарственном средстве содержится небольшое количество спирта (этанола). В связи с этим родители должны контролировать его применение. При отсутствии улучшения, неясности состояния или появлении новых симптомов обратитесь к врачу, так как в таком случае может идти речь о заболевании, требующем врачебной помощи.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C.