Инструкция по применению
Энтерол Капсулы 250 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: Biocodex
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сахаромицеты буларди
Количество в упаковке: 10 капсул
Дозировка действующего вещества: 1 капсула содержит лиофилизированных Saccharomyces boulardii 250 мг.
Срок годности: 3 года

Действующее вещество

Сахаромицеты буларди

Состав

Действующее вещество: Saccharomyces boulardii CNCM I-745 лиофилизат 250 мг.
Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат.Капсула: титана диоксид, желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Saccharomyces boulardii не является эубиотиком, не входит в состав микрофлоры здорового организма человека. Saccharomyces boulardii не всасывается, проходит через пищеварительный тракт в неизменном виде, без колонизации. Концентрация Saccharomyces boulardii в кишечнике поддерживается на постоянном уровне в течение периода применения препарата. Saccharomyces boulardii полностью выводится из организма в течение 2-5 дней после прекращения приема препарата.

Показания

Лечение и профилактика диареи любой этиологии у взрослых и детей от 1 года, в том числе при:дисбактериозе (дисбиозе) кишечника;острой инфекционной, вирусной или бактериальной диарее;диарее, вызванной приемом антибиотиков (антибиотико-ассоциированной диарее);синдроме раздраженного кишечника, энтероколите;диарее путешественников;диарее, вызванной Clostridium difficile, в сочетании с терапией ванкомицином или метронидазолом;нежелательных реакциях со стороны желудочно-кишечного тракта в ходе эрадикационной терапии Helicobacter pylori.

Способ применения и дозы

Детям с 1 года до 3 лет – 1 капсула два раза в день в течение 5 дней.Детям от 3 лет и взрослым – 1-2 капсулы два раза в день в течение 7-10 дней.Энтерол® следует принимать за 1 час до еды, запивая небольшим количеством жидкости. Не следует запивать горячими и алкогольными напитками. Для малолетних детей, а также в случаях затруднённого глотания, капсулу можно раскрыть и давать ее содержимое с холодной или чуть теплой жидкостью. Прием препарата для лечения острой диареи в обязательном порядке должен сопровождаться регидратацией.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата, аллергия на дрожжи, прежде всего на Saccharomyces boulardii.Наличие центрального венозного катетера, пациенты в тяжелом состоянии или с выраженными нарушениями иммунитета из-за риска фунгемии.Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, врожденная галактоземия, синдромглюкозо-галактозной мальабсорбции.Детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о применении Saccharomyces boulardii у беременных женщин и в период грудного вскармливания отсутствуют или ограничены.Saccharomyces boulardii не всасывается из желудочно-кишечного тракта.В качестве предупредительной меры предпочтительно проводить оценку соотношения ожидаемой пользы для матери к потенциальному риску применения для плода и ребенка до начала применения препарата во время беременности и в период грудного вскармливания.Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканейОчень редко: аллергические реакции – зуд, папулёзная сыпь (крапивница), кожная сыпь, местная или распространённая по всему телу (локальная или генерализованная экзантема), отек лица (ангионевротический отек).Нарушения со стороны иммунной системыОчень редко: анафилактические реакции или анафилактический шок.Нарушения со стороны желудочно-кишечного трактаРедко: метеоризм;Частота неизвестна: запор. Инфекционные и паразитарные заболеванияОчень редко: фунгемия (у пациентов, которым установлен центральный венозный катетер, а также у госпитализированных пациентов, лиц с иммунодефицитными состояниями (см. раздел «Особые указания»)).

Передозировка

Данных о передозировке препарата в настоящее время не имеется.

Взаимодействие с другими препаратами

Энтерол не принимают совместно с противогрибковыми препаратами.

Особые указания

Ощущение жажды и сухости во рту свидетельствует о недостаточной регидратации организма.

Условия хранения

При температуре 15-25°С, в недоступном для детей месте.