Инструкция по применению
Энтеросгель Паста для приема внутрь 225 г

Характеристики



Форма выпуска: Паста
Страна: Россия
Производитель: Силма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Полиметилсилоксана полигидрат
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Полиметилсилоксана полигидрат

Состав

Полиметилсилоксана полигидрат 70 г.Вспомогательные вещества: вода очищенная - 30 г.

Форма выпуска

Паста

Фармакокинетика

Препарат не всасывается из ЖКТ. Выделяется в неизмененном виде в течение 12 ч.

Показания

У взрослых и детей в качестве детоксикационного средства:— острые и хронические интоксикации различного происхождения— острые отравления сильнодействующими и ядовитыми веществами (в т.ч. лекарственными препаратами, алкоголем, алкалоидами, солями тяжелых металлов)— острые кишечные инфекции любого генеза в составе комплексной терапии (в т.ч. токсикоинфекции, сальмонеллез, дизентерия, диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз)— гнойно-септические заболевания, сопровождающихся выраженной интоксикацией, в составе комплексной терапии— пищевая и лекарственная аллергия— гипербилирубинемия (вирусный гепатит)— гиперазотемия (хроническая почечная недостаточность)— профилактика хронических интоксикаций у работников вредных производств (профессиональные интоксикации химическими агентами политропного действия, ксенобиотиками, инкорпорированными радионуклидами, соединениями свинца, ртути, мышьяка, нефтепродуктами, органическими растворителями, окислами азота, углерода, фторидами, солями тяжелых металлов).Коды МКБ-10

Способ применения и дозы

Энтеросгель; принимают внутрь за 1-2 ч до или после еды или приема других лекарственных средств, запивая водой. Необходимое для приема количество препарата рекомендуется размешать в стакане в тройном объеме воды комнатной температуры или принимать внутрь, запивая водой. Взрослым - 22.5 г (1 пакет или 1.5 столовой ложки) 3 раза/сут. Суточная доза - 67.5 г (3 пакета). Детям в возрасте от 5 до 14 лет - 15 г (1 столовая ложка) 3 раза/сут. Суточная доза - 45 г (2 пакета). Детям в возрасте до 5 лет - 7.5 г (0.5 столовой ложки) 3 раза/сут. Суточная доза - 22.5 г (1 пакет). Грудным детям рекомендуется 2.5 г (0.5 чайной ложки) препарата размешать в тройном объеме грудного молока или воды и давать перед каждым кормлением - 6 раз/сут. Для профилактики хронических интоксикаций - по 22.5 г (1 пакет) 2 раза/сут в течение 7-10 дней ежемесячно. При тяжелых интоксикациях в течение первых 3 сут доза препарата может быть увеличена вдвое. Продолжительность лечения при острых отравлениях составляет 3-5 суток, а при хронических интоксикациях и аллергических состояниях - 2-3 недели. Повторный курс по рекомендации врача.

Противопоказания

— индивидуальная непереносимость препарата— атония кишечника.

Условия хранения

В сухом месте