Инструкция по применению
Энтеростим Капсулы 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Индия
Производитель: ANANTA MEDICARE LIMITED
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Энтеростим - это безопасный пробиотик для улучшения состояния при диарее, благодаря полезным бактериям Saccharomyces boulardii.Способствует профилактике и улучшению состояния при диарее любой этиологии у взрослых и детей от 1 года, в том числе при дисбактериозе [дисбиозе] кишечника.Дополнительная информация. Диарея - это нередкий и весьма неприятный спутник различных нарушений работы кишечника. Для улучшения состояния при диарее было предложено немало средств, одними из самых интересных являются пробиотические микроорганизмы, благодаря их безопасности для собственной микрофлоры организма.В 1923 году французский микробиолог Анри Булар [Henry Boulard] открыл уникальные дрожжевые бактерии, которые способствуют не только антимикробным и антитоксинным эффектам, но и улучшают восстановление микрофлоры кишечника, не прекращая своего действия даже при повышенных температурах, в отличие от других пробиотиков. Этот штамм бактерий был назван в честь Анри Булара сахаромицетами Буларди (Saccharomyces boulardii). С тех пор сахаромицеты Буларди активно используются для улучшения состояния при диарее во всем мире.Saccharomyces boulardii являются пробиотическими организмами и действуют в желудочно-кишечном тракте как микроорганизмы, способствующие уменьшению симптомов диареи.Saccharomyces boulardii изучали на различных моделях в ходе исследований in vitro и in vivo, а также в ходе доклинических и клинических исследований, показавших, что пробиотик: способствует подавлению патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, благодаря антагонистическим эффектам в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: Clostridium difficile, Candida albicans, Candida krusei, Candida pseudotropicalis, Klebsiella pneumoniaex, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Staphylococcus aureus и других, а также Entamoeba histolytica и Lambliae, способствует антитоксинным эффектам в отношении бактериальных цито- и энтеротоксинов, поддерживает ферментативную функцию кишечника, компонент клеточной стенки Saccharomyces boulardii, маннитол, является субстратом для патогенных штаммов Escherichia coli и Salmonella typhimurium, что обусловливает их адгезию [прикрепление] к поверхности Saccharomyces boulardii и последующее выведение из организма.Saccharomyces boulardii не является эубиотикам, не входит в состав микрофлоры здорового организма человека. Saccharomyces boulardii не всасывается в кишечнике, проходит через пищеварительный тракт в неизменном виде, без колонизации. Концентрация Saccharomyces boulardii в кишечнике поддерживается на постоянном уровне в течение периода применения БАД. Saccharomyces boulardii полностью выводится из организма в течение 2-5 дней после прекращения приема биологически активной добавки к пище [БАД].

Состав

Действующее вещество (на 1 капсулу): сахаромицеты Буларди (Saccharomyces boulardii) МТСС 25076 (лиофилизат) - 5х10*9 КОЕ, капсула: гидроксипропилметилцеллюлоза (загуститель) Е464, диоксид титана (краситель) Е171, вода, каррагинан (агент желирующий) Е407, хлорид калия (агент желирующий) Е508, тальк Е553iii.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - источника пробиотических микроорганизмов [лиофилизированной дрожжевой культуры Saccharomyces boulardii]. Способствуют оказанию антимикробной активности по отношению к патогенным и условно- патогенным микроорганизмам, антитоксическому действию в отношении бактериальных цито- и энтеровирусов, повышению ферментативной функции кишечника, предотвращению и устранению симптомов острой диареи, интоксикации, а также нормализации консистенции каловых масс, созданию благоприятных условий для восстановления полезной микрофлоры пищеварительного тракта.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды, запивая теплой водой. детям от 1 года и взрослым по 1 капсуле 2 раза в день,В случае затрудненного глотания капсул, можно растворить содержимое капсулы в воде, йогурте, молоке.Продолжительность приема 5-10 дней. При необходимости прием можно повторить. При диарее путешественников продолжительность приема БАД по дням соответствует продолжительности путешествия.Прием БАД в случае острой диареи обязательно должен сопровождаться регидратацией [обильным питьём].

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом/ врачом-педиатром.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.