Инструкция по применению
Энтерумин Капсулы 800 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алюминия оксид+Углерод
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 800 мг

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 00 с корпусом серого цвета и крышечкой зеленого цвета. Содержимое капсул - порошок черного цвета.

Действующее вещество

Алюминия оксид+Углерод

Состав

Действующим веществом является углеродминеральный сорбент, содержащий алюминия оксид и углерод (Энтерумин). Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: Капсула твердая желатиновая: [состав корпуса капсулы: краситель железа оксид черный (Е 172) титана диоксид (Е 171) желатин состав крышечки капсулы: титана диоксид (Е 171) краситель железа оксид желтый (Е 172) краситель бриллиантовый синий (Е 133) желатин]

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Энтерумин® показан к применению у взрослых и детей: Острые отравления и заболевания, сопровождающиеся эндотоксикозом, с возможным диарейным синдромом: кишечные инфекции, гнойно-септические заболевания, печеночная и/или почечная недостаточность, гепатит, аллергические заболевания, интоксикация на фоне приема антибиотиков широкого спектра действия (антибиотики группы пенициллинов и азалидов, в том числе амоксициллин и азитромицин), нарушения обмена веществ, ожоговая болезнь, абстинентный алкогольный синдром. Профилактика похмельного синдрома. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза: Лечение острых отравлений и заболеваний, сопровождающихся эндотоксикозом, с возможным диарейным синдромом (кишечных инфекций, гнойно-септических заболеваний, печеночной и/или почечной недостаточности, гепатита, аллергических заболеваний, интоксикаций на фоне приема антибиотиков широкого спектра действия, нарушений обмена веществ, ожоговой болезни, абстинентного алкогольного синдрома): взрослым по 3-5 капсул 2-3 раза в день, детям по 1-3 капсулы 2-3 раза в день. Длительность лечения 3-14 дней. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Профилактика похмельного синдрома: после приема алкоголя в течение одного часа 2-3 капсулы однократно. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Применение у детей и подростков При назначении препарата детям до 3-х лет, следует принимать растворенный порошок из капсулы. Путь и (или) способ введения Принимать внутрь, запивая водой, за 1 час до или после еды и приема других лекарственных средств и не менее чем за 2 часа до или после приема антибиотиков. Если Вы забыли принять препарат Энтерумин® Если Вы забыли принять препарат, не принимайте двойную дозу для компенсации пропущенной, примите следующую дозу в обычное время., Экстемпоральное приготовление суспензии препарата Энтерумин® В случаях, когда у взрослых, подростков и детей существует проблема с проглатыванием капсул, необходимо открыть капсулу и высыпать ее содержимое в небольшое количество (1/2 стакана) воды. Смесь необходимо тщательно перемешать и дать пациенту целиком. Следует проглотить смесь сразу же после приготовления.

Противопоказания

Не принимайте препарат Энтерумин®: если у Вас аллергия на алюминия оксид, углерод или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), если у Вас кровотечение из желудочно-кишечного тракта (или подозрение на него), если Вы или Ваш ребенок испытываете затруднение при глотании, при детском возрасте до 3-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Исследований по безопасности и эффективности препарата у беременных и кормящих матерей не проводилось. При необходимости применения препарата во время беременности и в период грудного вскармливания следует проконсультироваться с врачом с целью оценки соотношения пользы для матери и потенциального риска для плода/грудного ребенка.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам Энтерумин® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Прекратите применение препарата Энтерумин® и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если заметите появление следующих симптомов: аллергические реакции, возможно появление запоров, которые устраняются приемом небольшой дозы слабительного, диетой или снижением дозы препарата с увеличением продолжительности курса.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Энтерумин® больше, чем следовало Если Вы приняли большую дозу, чем Вам было назначено, обратитесь к своему врачу или в местную поликлинику или больницу. Не забудьте взять с собой упаковку лекарства, чтобы врачам было понятно, какое лекарство Вы приняли. В настоящее время случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы (Ваш ребенок) принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Препарат не оказывает влияние на фармакокинетику антибиотиков группы пенициллинов и азалидов при соблюдении способа раздельного по времени приема - не менее 2 часов до и после приема антибиотиков. Препарат может применяться в комплексной терапии с антибиотиками группы пенициллинов и азалидов, при соблюдении способа применения. Препарат следует принимать за 1 час до или после приема других лекарственных средств.

Особые указания

Перед приемом препарата Энтерумин® проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Препарат Энтерумин® окрашивает каловые массы в черный цвет. Хранение препарата на воздухе снижает сорбционную способность.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Энтерумин не оказывает отрицательного влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятиям другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить при температуре ниже 30 °С.