Инструкция по применению
Энтобан капсулы 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Пакистан
Производитель: Herbion
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Айвы бенгальской плодов экстракт+Барбариса остистого плодов экстракт+Бутеи листьев экстракт+Голаррены коры экстракт+Дуба красильного коры экстракт+Мирта плодов экстракт
Количество в упаковке: 20

Описание

Твердые желатиновые капсулы зелёного цвета с надписью ENTOBAN на корпусе и колпачке, содержащие порошок от светло-коричневого до темно- коричневого цвета с характерным запахом. Размер капсул № 0.

Действующее вещество

Айвы бенгальской плодов экстракт+Барбариса остистого плодов экстракт+Бутеи листьев экстракт+Голаррены коры экстракт+Дуба красильного коры экстракт+Мирта плодов экстракт

Состав

В 1 капсуле содержится: Голаррены пушистой коры экстракта сухого (Holarrhena antidysenterica (L.) Wall, ex DC) 131 мг, Мирта обыкновенного плодов экстракта сухого (Myrtus communis L.) 131 мг, Барбариса остистого плодов экстракта сухого (Berberis aristata DC.) 32 мг, Айвы бенгальской плодов экстракта сухого (Aegle marmelos L.) 32 мг, Дуба красильного плодов экстракта сухого (Quercus infectoria Olivier) 32 мг, Бутеи великолепной смолы экстракта сухого (Butea frondosa Roxb.) 42 мг. Вспомогательные вещества: Тальк очищенный 100 мг. Состав оболочки капсулы: желатин 85-88 %, вода12,5-15%, титана диоксид 0,6%, натрия лаурилсульфат 0,01%, метилпарагидроксибензоат 0,04%, пропилпарагидроксибензоат 0,01 %, краситель бриллиантовый голубой (FD & C краситель Бриллиантовый синий № 1) 0,1%, краситель хинолиновый жёлтый (FD & C краситель Желтый №10 Хинолин) 0,15%, краситель солнечный закат жёлтый (FD & C краситель желтый № 6 Цвет заката солнца) 0,004%.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Поскольку Энтобан является многокомпонентным растительным препаратом изучение его фармакокинетики не представляется возможным.

Показания

Острый и хронический диарейный синдром неинфекционной этиологии

Способ применения и дозы

Внутрь: начальная доза - 2 капсулы далее - 1 капсула каждые 4 часа.
Продолжительность лечения до 10 дней.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, нарушения функции печени, воспалительные заболевания желудочно- кишечного тракта в период обострения (острый гастрит обострение хронического гастрита язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), кишечная непроходимость, диарея вызванная дизентерией гельминтозом солевыми слабительными (натрия сульфат и магния сульфат), наличие симптомов выраженного обезвоживания и нарушения электролитного баланса, беременность период грудного вскармливания детский возраст (до 18 лет).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки описано не было.

Взаимодействие с другими препаратами

Не выявлено.

Особые указания

Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и др. транспортными средствами работа с движущимися механизмами работа диспетчера и оператора и т. п.).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. В недоступном для детей месте.