Инструкция по применению
Энзистал Таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Торрент
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Панкреатин
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 192 мг+ 25 мг+ 50 мг
Срок годности: 36.0

Описание

Энзистал таблетки, покрытые пленочной оболочкой – ферментный препарат. Оказывает протеолитическое, амилолитическое и липолитическое действие.

Действующее вещество

Панкреатин

Состав

Активные вещества: Панкреатин 192,00 мг (активность протеазы: не менее 300 Ед. МФФ, активность липазы: не менее 6000 Ед.МФФ, активность амилазы: не менее 4500 Ед.МФФ), Экстракт бычьей желчи 25,00 мг, гемицеллюлаза 50,00 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный. Кишечнорастворимая оболочка: целлацефат, диэтил фталат. Сахарная оболочка: сахароза, кальция карбонат, тальк, акации камедь, желатин, титана диоксид, воск пчелиный желтый.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы, желудка, кишечника, печени, желчного пузыря (хронические воспалительно-дистрофические заболевания этих органов, состояние после резекции или облучения), метеоризм, диарея неинфекционного генеза, муковисцидоз. Для улучшения переваривания пищи у лиц с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании (употребление жирной пищи, большого количества пищи, нерегулярное питание), при нарушениях жевательной функции (повреждение зубов и десен, в период привыкания к искусственной челюсти), малоподвижном образе жизни, длительной иммобилизации. Подготовка к рентгенологическому исследованию и УЗИ органов брюшной полости. Как вспомогательное ЛС для скорейшего усвоения некоторых лекарственных средств (ПАСК, сульфаниламиды, антибиотики).

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 драже (таблетке с кишечнорастворимой оболочкой) 3 раза/сут во время или сразу после еды. Проглатывают целиком, разжевывать нельзя. При необходимости разовую дозу увеличивают в 2 раза. Продолжительность лечения - от нескольких дней (при нарушении пищеварения вследствие погрешностей в питании) до нескольких месяцев и лет (при необходимости постоянной заместительной терапии). Перед рентгенологическим исследованием и УЗИ - по 2 драже 2-3 раза/сут за 2-3 дня до исследования.

Противопоказания

Гиперчувствительность, Гипербилирубинемия, Острый панкреатит, хронический панкреатит (обострение), гепатит, печеночная недостаточность, печеночная кома или прекома, эмпиема желчного пузыря, холелитиаз, механическая желтуха, кишечная непроходимость

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью: беременность.

Побочные действия

Аллергические реакции (гиперемия кожи, чиханье, слезотечение), диарея, тошнота, боль в животе (в т.ч. кишечная колика), гиперурикемия, гиперурикозурия. У детей (при приеме в больших дозах) - перианальное раздражение, раздражение слизистой оболочки полости рта.

Передозировка

Симптомы: гиперурикемия и гиперурикурия. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Уменьшает биодоступность препаратов железа Повышает абсорбцию ПАСК, сульфаниламидов, антибиотиков Циметидин усиливает действие препарата. Антациды, содержащие ионы магния и/или кальция, снижают эффективность препарата.

Условия хранения

При комнатной температуре