Инструкция по применению
Энзистал Таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Торрент
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гемицеллюлаза+Желчи компоненты+Панкреатин
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 192 мг+ 25 мг+ 50 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Гемицеллюлаза+Желчи компоненты+Панкреатин

Состав

Панкреатин 192,00 мг (активность протеазы: не менее 300 Ед.МФФ, активность липазы: не менее 6000 Ед.МФФ, активность амилазы: не менее 4500 Ед.МФФ), Экстракт бычьей желчи 25,00 мг, Гемицеллюлаза 50,00 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для улучшения пищеварения у лиц с нормальной функцией желудочно-кишечного тракта в случае погрешностей в питании (нерегулярное/нерациональное питание, употребление жирной пищи, переедание); При нарушении, жевательной функции, вынужденной длительной иммобилизации, малоподвижном образе жизни; Недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы (хронический панкреатит, муковисцидоз); Хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря; состояния после резекции или облучения этих органов, сопровождающиеся нарушениями переваривания пищи, метеоризмом, диареей (в составе комбинированной терапии); Подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости.

Способ применения и дозы

Энзистал принимают внутрь, не разжевывая, во время или сразу после еды, запивая небольшим количеством жидкости. Взрослые – по 1-2 таблетки 3 раза в сутки. Более высокие дозы назначаются врачом. Дети старше 6 лет (по назначению врача) – по 1 таблетке 2-3 раза в сутки. Продолжительность лечения может варьировать от нескольких дней (при нарушении процесса пищеварения вследствие погрешностей в питании) до нескольких месяцев или лет (при необходимости постоянной заместительной терапии). Перед рентгенологическим или ультразвуковым исследованием – 2 таблетки 2-3 раза в сутки в течение 2-3 дней перед исследованием.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, печеночная недостаточность, гепатит, механическая желтуха, желчнокаменная болезнь, эмпиема желчного пузыря, кишечная непроходимость, детский возраст до 6 лет, холелитиаз.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью: беременность.

Побочные действия

Аллергические реакции, тошнота, диарея, боли в животе, снижение эндогенного синтеза желчных кислот. При длительном применении в высоких дозах возможно развитие гиперурикозурии, повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови. У детей при применении высоких доз возможно развитие перианального раздражения и раздражения слизистой оболочки полости рта.

Передозировка

Симптомы: гиперурикемия и гиперурикурия.

Взаимодействие с другими препаратами

Уменьшает биодоступность препаратов железаПовышает абсорбцию ПАСК, сульфаниламидов, антибиотиков.Циметидин усиливает действие препарата.Антациды, содержащие ионы магния и/или кальция, снижают эффективность препарата.

Условия хранения

В сухом месте