Инструкция по применению
Эпигаллат Капсулы массой 395 мг 120 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Ацино Рус
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 120
Срок годности: 24

Описание

Капсулы Эпигаллат - негормональная биологическая добавка к пище, которая подавляет рост кровеносных сосудов в патологических очагах. Эпигаллат блокирует рост новых сосудов в пораженных тканях, нарушает кровоснабжение патологических очагов. Активные вещества Эпигаллата обладают множественным этиопатогенетическим действием в отношении гиперпластических процессов репродуктивной системы. Подавляет патологический рост и деление клеток в органах и тканях женской репродуктивной системы, обусловленные негормональными стимулами. Снижает инвазивную активность клеток эндометрия, а также вызывает избирательную гибель (апоптоз) клеток с повышенной пролиферативной активностью. Эпигаллат обладает выраженным антиангиогенным действием (подавляет патологический рост новых сосудов) и, таким образом, препятствует росту новообразований. Является эффективным противовоспалительным средством, подавляя активность циклооксигеназы второго типа, простогландинов и синтез провоспалительных цитокинов, а кроме того, усиливает действие антибиотиков и повышает чувствительность резистентных микроорганизмов к действиюантибактериальных агентов. Обладает выраженным антиоксидантным действием, нейтрализуя образование свободных радикалов.

Состав

Состав На 1 капсулу (0,5 г) Лактозы моногидрат (375,0 мг), капсула (желатин, вода) (96 мг), экстракт зеленого чая (70,0 мг), минеральный премикс (50,0 мг) (цинка сульфат моногидрат, меди сульфат моногидрат, йодид калия, железа (II) лактат дигидрат, марганец сульфат моногидрат, селенит натрия); аэросил (антислеживающий агент) (0,5 мг)

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника эпигаллокатехин-3-галлата и дополнительного источника железа, меди, йода, цинка, марганца, селена

Способ применения и дозы

Взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить В составе комбинированной терапии (гиперплазия эндометрия без атипии, эндометриоз, аденомиоз, миома матки) Эпигаллат® рекомендуется принимать внутрь в сочетании с БАД Индинол® (1 капсула + 1 капсула) 3 раза во время еды в течение 2-3 недель. Возможно более длительное применение по рекомендации врача.

Противопоказания

Эпигаллат® противопоказан при индивидуальной непереносимости компонентов препарата. Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. Лицам с заболеваниями щитовидной железы обязательна консультация врача-эндокринолога Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

По данным доклинического и клинического изучения, Эпигаллат® хорошо переносится, не оказывая в терапевтических дозах побочных эффектов

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При комнатной температуре