Инструкция по применению
Эпиген Интим Спрей для местного и наружного применения 0,1 % 60 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Испания
Производитель: ИНВАР
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аммония глицирризинат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.1%
Срок годности: 36

Действующее вещество

Аммония глицирризинат

Состав

Действующее вещество: Глицирризиновая кислота (Glycyrrhizinic acid)Концентрация действующего вещества (мг): 1

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

При наружном и местном применении активированная глицирризиновая кислота депонируется в очагах поражения. Системная абсорбция происходит медленно. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания

Лечение инфекций половых органов, вызванных вирусом Herpes simplex типа 2 (как при остром первичном, так и при рецидивирующем течении); лечение инфекций кожи, вызванных вирусом Varicella zoster (в составе комбинированной терапии); лечение инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом папилломы человека; лечение неспецифических вагинитов, кольпитов.Профилактика распространенных вирусных инфекций, передаваемых половым путем.

Способ применения и дозы

Наружно, интравагинально, интрауретрально. Перед употреблением баллон встряхнуть. При применении баллон держать в вертикальном положении. При наружном применении препарат наносится на всю пораженную поверхность кожи с расстояния 4–5 см 1–2 нажатиями клапана, что является оптимальной терапевтической дозой.Для интравагинального применения препарата прилагается специальная насадка с распылителем. Снять клапан с баллона пульверизатора и надеть клапан насадки. Затем насадку ввести во влагалище и произвести впрыскивание путем 1–2 нажатий насадки, что является оптимальной терапевтической дозой.При применении мужчинами, помимо наружного нанесения, препарат впрыскивается в наружное отверстие мочеиспускательного канала 1–2 нажатиями клапана пульверизатора.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к глицирризиновой кислоте.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период лактации возможно по абсолютным показаниям.В экспериментальных исследованиях не установлено эмбриотоксического и тератогенного действия глицирризиновой кислоты.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Передозировка

Данных о передозировке препарата Эпиген нет.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении глицирризиновой кислоты с другими противовирусными препаратами (ацикловир, йодоуридин, интерферон) отмечается потенцирование противовирусного действия.

Особые указания

При лечении инфекций кожи, вызванных вирусом Varicella zoster, наружное применение глицирризиновой кислоты следует сочетать с приемом внутрь специфических противовирусных препаратов.

Условия хранения

Беречь от детей