# Инструкция по применению
# Эпистат сироп 2мг/мл 150мл

## Характеристики




Форма выпуска: Сироп
Страна: Венгрия
Производитель: Гедеон Рихтер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фенспирид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2 мг/мл

## Описание

Сироп Эпистат - средство с бронхолитическим и противовоспалительным действием. Уменьшает проявления бронхоспазма и воспаления в дыхательных путях.

## Действующее вещество

Фенспирид

## Форма выпуска

Сироп

## Фармакокинетика

Хорошо абсорбируется из ЖКТ. Cmax достигается через 6 часов после приема и через 12 часов снижается в 3 раза. Выводится преимущественно почками (90%), через кишечник – 10%. T1/2 - 12 часов.

## Показания

Ринофарингит, ларингит, отит, синусит, ринотрахеобронхит, бронхит, поддерживающая терапия изолированной и осложненной бронхиальной астмы, симптомы со стороны дыхательных путей при кори, коклюше, гриппе.

**Способ применения и дозы**

Принимают внутрь до еды. Взрослым - по 80 мг 2-3 раза/сутки, детям старше 2 лет (в соответствующей лекарственной форме) - 4 мг/кг/сутки.