Инструкция по применению
Эпостим Раствор для внутривенного и подкожного введения 2000 МЕ/мл ампулы 1 мл 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Эпоэтин бета
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 2000 МЕ/мл

Описание

Раствор Эпостим для внутривенного и подкожного введения - гликопротеид, специфически стимулирующий эритропоэз, активирует митоз и созревание эритроцитов из клеток-предшественников эритроцитарного ряда.

Действующее вещество

Эпоэтин бета

Форма выпуска

Ампулы

Фармакокинетика

После подкожного введения Cmax в плазме достигается через 12-28 часов. T1/2 в конечной фазе - 13-28 часов. После внутривенного введения T1/2 активного вещества составляет 4-12 часов.

Показания

Выраженная анемия, возникающая на фоне хронической почечной недостаточности, анемия при поражениях костного мозга и некоторых хронических заболеваниях (в т.ч. апластическая анемия, анемия при миелодиспластических заболеваниях, при хронических воспалительных заболеваниях, СПИД, раке), профилактика анемии у недоношенных новорожденных, родившихся с массой тела 750-1500 г до 34-й недели беременности, для увеличения объема донорской крови, предназначенной для последующей аутотрансфузии с целью избежания гемотрансфузий.

Способ применения и дозы

Дозы, схема и продолжительность лечения устанавливаются индивидуально, зависят от выраженности анемии, тяжести состояния больного, характера заболевания. Вводят подкожно и внутривенно. Начальные дозы - 50-150 МЕ/кг, частота введения - в среднем 3 раза в неделю.