Инструкция по применению
Эректогенон капсулы 500мг N4

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Риа Панда
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 4
Срок годности: 24.0

Описание

Капсулы Эректогенон - препарат для мужчин, страдающих эректильной дисфункцией. Состоит из растительных мужских адаптогенов, обладающих высокой биологической активностью. Натуральные растительные экстракты, витамины и микроэлементы дополняют и усиливают действие друг друга, способствуя нормализации кровообращения в мужских половых органах, повышению полового влечения, улучшению качества эрекции, что в свою очередь повышает уровень самооценки. Компоненты комплекса способствуют: восстановлению здоровой эрекции, усилению полового влечения (либидо) и обеспечению естественного ответа на сексуальное возбуждение, усилению сексуальных и эмоциональных ощущений во время интимной близости, продлению времени полового акта, улучшению кровоснабжения органов малого таза, повышению работоспособности и выносливости, улучшению двигательной активности и реакционной способности, повышению эффективности специализированного лечения (в комплексной терапии) любых видов нарушений эрекции.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для мужчин, страдающих эректильной дисфункцией, снижением полового влечения.

Способ применения и дозы

Взрослым мужчинам по 1 капсуле 1 раз во второй половине дня во время еды. 3-4 недели. При необходимости прием можно повторить.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов, повышенной нервной возбудимости, бессоннице, гипертонии, нарушении сердечной деятельности, выраженном атеросклерозе.

Побочные действия

Эректогенон не принимается вместе с иными активными добавками, с алкоголем. Если необходимо употреблять средство с какими-то определенными лекарственными препаратами, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Передозировка

При приеме биокомплекса более чем одной капсулы в сутки могут наблюдаться следующие симптомы: повышенная сонливость, потливость, нервозность, агрессивность, рвота, тошнота, эпилептический припадок, судорожное состояние и т.д. Все симптомы проходят после прекращения применения средства и после промывания желудка с дальнейшим приемом активированного угля.

Взаимодействие с другими препаратами

Перед применением проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Не подвергать воздействию прямого солнечного света