Инструкция по применению
Эреспал Сироп 150 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: СЕРВЬЕ РУС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фенспирид
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Фенспирид

Состав

Действующее вещество: Фенспирид(Fenspiride)Концентрация действующего вещества (мг): 200 мг

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

ВсасываниеХорошо всасывается из ЖКТ. После приема внутрь Cmax достигается через 2.3±2.5 ч (от 0.5 до 8 ч).ВыведениеT1/2 составляет 12 ч. Выводится преимущественно почками (90%), через кишечник 10%.

Показания

Заболевания верхних и нижних дыхательных путей:Ринофарингит и ларингит; Трахеобронхит;Бронхит (на фоне хронической дыхательной недостаточности или без нее);Бронхиальная астма (в составе комплексной терапии);Респираторные явления (кашель, осиплость голоса, першение в горле) при кори, коклюше и гриппе;При инфекционных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, когда показана стандартная антибиотикотерапия.Отит и синусит различной этиологии.

Способ применения и дозы

Внутрь. Перед употреблением взбалтывать. Взрослые и подростки: От 3 до 6 столовых ложек сиропа (45 – 90 мл) в сутки, принимать перед едой. Дети от 2-х лет: Рекомендуемая доза 4 мг/кг/сутки. масса тела до 10 кг: от 2 до 4 чайных ложек сиропа в сутки (или 10 – 20 мл), можно добавлять в бутылочку с питанием масса тела больше 10 кг: от 2 до 4 столовых ложек сиропа в сутки (или 30 – 60 мл), принимать перед едой1 столовая ложка (15 мл сиропа) содержит 30 мг фенспирида гидрохлорида и 9 г сахарозы. 1 чайная ложка (5 мл сиропа) содержит 10 мг фенспирида гидрохлорида и 3 г сахарозы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному веществу и/или какому-либо из компонентов препарата. Детский возраст до 2 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о применении препарата Эреспал у беременных женщин отсутствуют или ограничены. Применение препарата при беременности не рекомендуется.Терапия фенспиридом не является основанием для прерывания наступившей беременности.Не следует применять Эреспал во время грудного вскармливания в связи с отсутствием данных о проникновении фенспирида в грудное молоко.

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы Редко: умеренная тахикардия, выраженность которой уменьшается при снижении дозы препарата. Со стороны пищеварительной системы Часто: желудочно-кишечные расстройства, тошнота, боль в эпигастрии. Неустановленной частоты: диарея, рвота. Со стороны центральной нервной системы Редко: сонливость. Неустановленной частоты: головокружение. Общие расстройства и симптомы Неустановленной частоты: астения, повышенная усталость. Со стороны кожных покровов и подкожно-жировой клетчатки Редко: эритема, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, фиксированная пигментная эритема. Неустановленной частоты: кожный зуд. Риск развития реакций повышенной чувствительности на краситель Сансет желтый S, входящий в состав препарата.

Передозировка

При передозировке препарата (отмечены случаи передозировки при приеме препарата в дозе более 2320 мг) пациенту следует немедленно обратиться за медицинской помощью.Симптомы: сонливость или возбуждение, тошнота, рвота, синусовая тахикардия.Лечение: промывание желудка, мониторинг ЭКГ, поддержание жизненно важных функций организма.

Взаимодействие с другими препаратами

Специальных исследований по взаимодействию фенспирида с другими лекарственными средствами не проводилось.Из-за возможного седативного эффекта при приеме блокаторов гистаминовых H1-рецепторов не рекомендуется применение препарата Эреспал сироп в сочетании с лекарственными средствами, обладающими седативным действием, или совместно с алкоголем.

Особые указания

В состав препарата в форме сиропа входят парабены (парагидроксибензоаты), вследствие этого прием данного лекарственного средства может провоцировать развитие аллергических реакций, в т.ч. отсроченных.При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что Эреспал сироп содержит сахарозу (1 чайная ложка - 3 г сахарозы = 0.3 ХЕ; 1 столовая ложка - 9 г сахарозы = 0.9 ХЕ).Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиИсследований по изучению влияния препарата Эреспал на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводилось. Пациенты должны быть осведомлены о возможном развитии сонливости при приеме препарата Эреспал, особенно в начале терапии или при сочетании с приемом алкоголя, и должны соблюдать осторожность при управлении автотранспортными средствами и при выполнении работ, требующих высокой скорости психомоторных реакций.