Инструкция по применению
Эреспал таблетки покрытые оболочкой 80мг N30

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: СЕРВЬЕ РУС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фенспирид
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 80 мг



Действующее вещество

Фенспирид

Состав

Действующее вещество: Фенспирид(Fenspiride)Концентрация действующего вещества (мг): 80

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь Cmax достигается через 6 ч.ВыведениеT1/2 - 12 ч. Выводится преимущественно почками.

Показания

Заболевания верхних и нижних отделов дыхательных путей: ринофарингит и ларингит; трахеобронхит; бронхит (на фоне хронической дыхательной недостаточности или без нее); бронхиальная астма (в составе комплексной терапии); респираторные явления (кашель, осиплость голоса, першение в горле) при кори, коклюше, гриппе; инфекционные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем, когда показана стандартная антибиотикотерапия.Отит и синусит различной этиологии.

Способ применения и дозы

Взрослым препарат назначают по 80 мг (1 таб.) 2-3 раза/сут.Максимальная суточная доза составляет 240 мг. Продолжительность лечения определяется врачом.

Противопоказания

Детский возраст до 18 лет (для лечения детей и подростков в возрасте до 18 лет следует использовать Эреспал сироп); повышенная чувствительность к активному веществу и/или какому-либо из компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о применении препарата Эреспал у беременных женщин отсутствуют или ограничены. Применение препарата при беременности не рекомендуется.Терапия фенспиридом не является основанием для прерывания наступившей беременности.Не следует применять Эреспал во время грудного вскармливания в связи с отсутствием данных о проникновении фенспирида в грудное молоко.

Побочные действия

Пациент должен быть проинформирован о необходимости сообщать врачу о любых, в т.ч. не упомянутых выше нежелательных реакциях, а также об изменении лабораторных показателей на фоне терапии препаратом Эреспал.Наиболее частые побочные реакции на препарат Эреспал наблюдаются со стороны пищеварительной системы.Частота побочных реакций, которые могут возникать во время терапии, приведена в виде следующей градации: очень часто (больше1/10); часто (больше1 /100, меньше1/10); нечасто (больше1/1000, меньше1/100); редко (больше1/10 000, меньше1/1000); очень редко (меньше1/10 000); неустановленной частоты (частота не может быть подсчитана по доступным данным).Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко - умеренная тахикардия, выраженность которой уменьшается при снижении дозы препарата; неустановленной частоты* - ощущение сердцебиения и снижение АД, возможно связанные с тахикардией.Со стороны пищеварительной системы: часто - желудочно-кишечные расстройства, тошнота, боль в эпигастрии; неустановленной частоты* - диарея, рвота.Со стороны ЦНС: редко - сонливость; неустановленной частоты* - головокружение.Со стороны кожных покровов и подкожно-жировой клетчатки: редко - эритема, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, фиксированная пигментная эритема; неустановленной частоты* - кожный зуд, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона.Общие расстройства: неустановленной частоты* - астения, повышенная утомляемость.* Данные пострегистрационного применения.

Передозировка

При передозировке препарата (отмечены случаи передозировки при приеме препарата в дозе более 2320 мг) пациенту следует немедленно обратиться за медицинской помощью.Симптомы: сонливость или возбуждение, тошнота, рвота, синусовая тахикардия.Лечение: промывание желудка, мониторинг ЭКГ, поддержание жизненно важных функций организма.

Взаимодействие с другими препаратами

Специальных исследований по взаимодействию фенспирида с другими лекарственными средствами не проводилось.Из-за возможного седативного эффекта при приеме блокаторов гистаминовых Н1-рецепторов не рекомендуется применение препарата Эреспал в сочетании с лекарственными средствами, обладающими седативным действием, или совместно с алкоголем.

Особые указания

Для лечения детей и подростков в возрасте до 18 лет следует использовать Эреспал сироп.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиИсследований по изучению влияния препарата Эреспал на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводилось. Пациенты должны быть осведомлены о возможном развитии сонливости при приеме препарата Эреспал, особенно в начале терапии или при сочетании с приемом алкоголя, и должны соблюдать осторожность при управлении автотранспортными средствами и при выполнении работ, требующих высокой скорости психомоторных реакций.